

Nakuhang Nakabaong Ari & Ang Pagpapaayos Nito

Impormasyon para sa Pasyente · Kung kailan natatago ang ari, at paano ito naibabalik ng operasyon

WARWIKI

Ang nakuhang nakabaong ari (acquired buried penis) ay nangyayari kapag ang ari ay **natakpan ng balat at taba** ng ibabang bahagi ng tiyan, scrotum, o hita sa isang may-gulang. Maaari itong magdulot ng problema sa kalinisan, paulit-ulit na impeksiyon ng balat, kahirapan sa pag-ihi habang nakatayo, at abala sa pakikipagtalik. Ito ay isang kilala at maaaring gamutin na problema — ang operasyon ay makakatulong na palayain at ibalik ang ari.

Tungkol sa Kondisyong Ito

Ang “nakuha” (acquired) ay nangangahulugang nangyari ito sa pagiging may-gulang (hindi katulad ng karaniwang nakabaong ari sa ilang bata). Kasama sa mga karaniwang dahilan ang **pagbaba ng timbang** at mabigat na taba sa ibabang tiyan, peklat mula sa circumcision o nakaraang operasyon, talamak na pamamaga ng balat (**lymphedema**), at isang sakit sa balat na nagdudulot ng peklat na tinatawag na **lichen sclerosis**.

Karaniwang nagiging ikot ng kahirapan ito:

- Ang nakulong na balat ay nananatiling basa at nagiging **namumula at nahahawa**.
- Ang pagkalat ng ihi sa nakulong na balat ay nagpapalala ng pangangati at peklat.
- Unti-unting nagiging mas mahirap ang kalinisan, pag-ihi, at pakikipagtalik.

Bakit Nakatutulong ang Operasyon

Nilalayon ng operasyon na **palayain ang ari**, alisin ang may sakit na balat, at muling takpan ito ng malusog na balat upang makaihi kang nakatayo, mapanatili ang kalinisan, at makabalik sa normal na aktibidad — mataas ang kasiyahan ng mga pasyente pagkatapos ng operasyon.

MGA TERMINO

Nakabaong ari (buried penis)

Ang ari na natakpan ng kapaligiran nitong balat at taba.

Panniculectomy

Pag-alis ng nakabitin na taba at balat sa ibabang tiyan.

Escutcheonectomy

Pag-alis ng taba na nasa itaas ng ari.

Skin graft

Malusog na balat na inilipat upang takpan ang katawan ng ari.

Lichen sclerosis

Sakit sa balat na nagdudulot ng peklat na maaaring maging sanhi o magpalala nito.

Lymphedema

Talamak na pamamaga ng balat na maaaring magtago ng ari.

KAILANGAN KO BA MUNANG PUMAYAT? Kadalasan, oo — para sa nakabaong ari na dahil sa timbang, ang pagbaba ng timbang (minsan may referral sa bariatric na doktor) ay nagpapabuti ng resulta at tagal nito, kaya maaaring payuhan kayo ng inyong team na gawin ito bago o kasabay ng operasyon. Ang operasyon mismo ay karaniwang **inaalis ang mabigat na taba** sa parehong pagkakataon.

Paano Isinasagawa ang Operasyon

- 1 Ang ari ay **pinalaya** mula sa peklat at tisyung humaharang.
- 2 Ang may sakit o peklat na balat ay inalis; ang katawan ng ari ay karaniwang muling tinatakpan ng **skin graft**.
- 3 Ang nakabitin na taba at balat ay inalis (**panniculectomy / escutcheonectomy**); maaari ring hubugin ang scrotum.
- 4 Minisan ito ay ginagawa sa **maraming yugto**; inilalagay ang catheter at karaniwang may mga drain.

Paano Maghanda

- **Pag-aayos ng timbang** (maaaring may referral sa bariatric) at **tigilan ang paninigarilyo** — parehong lubos na nakakaapekto sa paggaling.
- Gamutin muna ang anumang aktibong impeksiyon sa balat; sundin ang mga tagubilin para sa anesthesia.
- Mag-ayos ng tulong sa bahay at bakasyon — matagal ang proseso ng paggaling.

Pagkatapos ng Operasyon

- Asahan ang **pananatili sa ospital**, catheter, at mga drain sa ilang panahon.
- Kung ginamit ang skin graft, **pangalagaan ito** — iwasan ang pag-upo o presyon sa lugar ayon sa tagubilin.
- Pag-aalaga ng sugat at unti-unting pagbabalik sa aktibidad; ang pagkontrol ng timbang ay nagpoprotekta sa resulta.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat, kumakalat na pamumula, o masamang amoy na drainage (impeksiyon)
- Skin graft o sugat na nagiging **maitim**, bumubukas, o matinding pagdurugo
- **Hindi kayo makapagihi**, o huminto ang drainage ng catheter

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang nakuhang nakabaong ari ay nagtatago ng ari sa ilalim ng balat at taba, na nagdudulot ng problema sa kalinisan, pag-ihi, impeksiyon, at pakikipagtalik — at maaari itong ayusin.
2. Ang operasyon ay nagpapalaya ng ari, nag-aalis ng may sakit na balat (kadalasan may skin graft), at nag-aalis ng mabigat na taba; maaari itong gawin sa maraming yugto.
3. Ang pagbaba ng timbang at pag-iwas sa paninigarilyo ay lubos na nagpapabuti ng resulta. Tumawag para sa lagnat, pag-itim ng skin graft, o kahirapan sa pag-ihi.