

ACT Adjustable Balloons (para sa Kababaihan)

Impormasyon para sa Pasyente · Dalawang adjustable balloons na sumusuporta sa urethra para sa stress leakage

WARWIKI

Ang ACT (**Adjustable Continence Therapy**) ay isang maliit na **adjustable** na implant para sa mga babaeng may **stress urinary incontinence** — pagtagas ng ihi kapag umubo, tumatawa, nagbubuhay, o nag-eehersisyo. Dalawang maliliit na silicone balloons ang inilalagay sa magkabilang panig ng urethra, malapit sa bladder neck, para mahinahong suportahan ito at mapabuti ang kontrol. Tulad ng katapat nitong para sa lalaki (ProACT), ang mga balloon ay maaaring **i-fine-tune sa opisina** pagkatapos ng operasyon.

Paano Ito Gumagana

Ang stress leakage ay nangyayari kapag mahina ang suporta at presyur sa ilalim ng urethra. Ang dalawang balloon ay nagdaragdag ng mahinahon at nababagong suporta sa tabi ng urethra para manatiling sarado ito kapag may puwersa — **nang hindi** ito basta-basta tinotorke. Bawat balloon ay konektado sa isang maliit na **port** sa ilalim ng balat ng labia, na ginagamit ng inyong siruhano para ayusin ang laman.

Angkop Ba Ito para sa Akin?

- Isang pagpipilian para sa **stress urinary incontinence**, kadalasang isinasalang-alang kapag hindi naging epektibo ang nakaraang operasyon para sa pagtagas o kapag mahina ang closing muscle (ISD)
- Mabuti kung gusto ninyo ng minimally invasive, **adjustable**, at **maaaring alisin** na pagpipilian
- Nag-iiba ang availability ayon sa bansa** — ginagamit ito sa mga espesyalisadong sentro at hindi available sa lahat ng lugar; itanong sa inyong siruhano kung available ito sa inyong lugar
- Hindi gaanong angkop para sa pagtagas na dulot pangunahin ng **prolapse** o **overactive bladder**

MGA TERMINO

Stress incontinence

Pagtagas ng ihi kapag umubo, tumatawa, nagbubuhay, o nag-eehersisyo.

Bladder neck

Kung saan nagtatagpo ang pantog at ang urethra (ang tubo para sa ihi).

Balloon

Isang maliit na silicone balloon na nagdaragdag ng mahinahon at nababagong suporta.

Port

Isang maliit na balbula sa ilalim ng balat ng labia para ayusin ang balloon.

Titration

Pag-aayos ng laman ng balloon sa ilang pagbisita sa opisina.

ISD

Intrinsic sphincter deficiency — mahina ang closing muscle ng urethra.

MASAKIT BA? Ang mga balloon ay inilalagay sa isang **maikling operasyon** sa ilalim ng anesthesia (general o spinal, o local na may sedation), kadalasan bilang **day procedure** sa pamamagitan ng maliliit na butas malapit sa vaginal opening — walang malaking hiwa. Maaaring maramdaman ang paninikip at pamamaga nang ilang araw. Ang mga susunod na pag-aayos sa opisina ay mabilis at gumagamit lamang ng maliit na karayom sa port.

Paano Ito Isinasagawa

- 1 Sa ilalim ng anesthesia, gamit ang **X-ray o ultrasound** para sa gabay, naglalagay ang siruhano ng isang balloon sa **bawat panig** ng urethra malapit sa bladder neck sa pamamagitan ng maliliit na butas sa tabi ng vaginal opening.
- 2 Ang mga connecting tube ay inilalagay sa **dalawang port** sa ilalim ng balat ng labia.
- 3 Ang mga balloon ay halos walang laman sa simula at iniwan para gumaling.

Pag-aayos ng Device

- Pagkalipas ng ilang linggo, magdadagdag ang inyong care team ng kaunting likido sa pamamagitan ng labial port **sa opisina** — mabilis na karayom, walang operasyon.
- Paulit-ulit sa ilang pagbisita hanggang magkaroon ng magandang kontrol **nang walang kahirapan sa pag-ihi**.
- Maaaring ayusin pataas o pababa anumang oras; ang buong device ay maaaring **alisin** kung kinakailangan.

Pagkatapos

- Banayad na paninikip, pamamaga, o pasa nang ilang araw; iwasan ang mabigat na pagbubuhay at matinding aktibidad sa maikling panahon.
- Unti-unting bumababa ang pagtagas habang ini-tune ang mga balloon — hindi palaging agad.
- Sabihin sa anumang susunod na siruhano o imaging team na mayroon kayong implant.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Hirap sa pag-ihi** o hindi makalabas ng ihi (maaaring masyadong puno ang balloon, o may pamamaga)
- Lagnat, lumalagong sakit, pamumula, o may dumudulas sa lugar ng operasyon (posibleng impeksiyon)
- Bagong kakulangan sa puki (vagina) o discharge, o dugo sa ihi (posibleng erosion)

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Gumagamit ang ACT ng dalawang adjustable balloons para suportahan ang urethra at bawasan ang stress leakage — minimally invasive at maaaring alisin.
2. Inilalagay ito sa pamamagitan ng maliliit na butas, pagkatapos ay ini-fine-tune sa opisina sa ilang pagbisita sa pamamagitan ng labial port.
3. Kadalasang ginagamit para sa paulit-ulit na pagtagas o mahinang sphincter; nag-iiba ang availability ayon sa bansa — tumawag agad kung hindi kayo makapag-ihi o may tanda ng impeksiyon.