

Alpha Blockers (para sa Prostate / Daloy ng Ihi)

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Mga tableta na nagpapaluwag ng daanan ng ihi

Ang alpha blockers ay mga tableta na **nagpapaluwag ng kalamnan sa prostate at bladder neck** (pintuan ng pantog) upang mas madaling umihi — karaniwang unang gamot para sa mga sintomas ng **paglaki ng prostate (BPH)**. Kabilang dito ang **tamsulosin (Flomax)**, **alfuzosin**, **silodosin**, **doxazosin**, at **terazosin**. Mabilis ang epekto ngunit hindi nito pinaliit ang prostate.

Paano Ito Gumagana

Ang paglaki ng prostate ay pumipiga sa daanan ng ihi. Ang alpha blockers ay **nagpapaluwag ng kalamnan sa bladder outlet**, nagbibigay ng mas malakas na daloy at nababawasan ang pag-aatubili, pag-igting, at paminsan-minsang paghinto ng ihi. Ginagamot nito ang **mga sintomas** — hindi binabago ang sukat ng prostate, kaya nananatili lamang ang benepisyo habang iniinom ito.

Ano ang Aasahan

- Karaniwang **mabilis** ang pagbabago — sa loob ng ilang araw hanggang dalawang linggo.
- Kadalasang iniinom nang **isang beses sa isang araw**; ang tamsulosin ay iniinom mga **30 minuto pagkatapos ng pagkain** sa parehong oras araw-araw.
- Ang doxazosin/terazosin ay sisimulan **sa gabi bago matulog** at dahan-dahang tataas ang dosis upang maiwasan ang pagkahilo.
- Maaaring pagsabayin sa gamot na nagpapaliitin ng prostate para sa mas malalaking prostate.

MGA TERMINO

Alpha blocker

Tableta na nagpapaluwag ng kalamnan sa bladder outlet.

BPH

Benign prostatic hyperplasia — paglaki ng prostate.

Bladder neck

Ang makalamnan na pintuan ng pantog papunta sa urethra.

Retrograde ejaculation

Tamod na pumupunta pabalik sa pantog — hindi mapanganib ngunit bawas o wala ang lumabas na likido.

Orthostatic hypotension

Pagkahilo dahil sa pagbaba ng presyon ng dugo kapag tumayo.

IFIS

Floppy iris syndrome sa cataract surgery — sabihin sa inyong eye surgeon.

MAY CATARACT SURGERY BA KAYO? Sabihin sa inyong eye surgeon na umiinom (o nakainom na) kayo ng alpha blocker — maaari itong magpahiwatig ng “floppy” iris habang isinasagawa ang cataract surgery (floppy iris syndrome sa cataract surgery, o IFIS), at magiging handa sila para dito. Mahalaga ito **kahit tumigil na kayo** sa gamot.

Paano Inumin

- Inumin ito **sa parehong oras araw-araw** ayon sa utos ng doktor (ang tamsulosin ay ~30 minuto pagkatapos ng pagkain).
- Sa doxazosin/terazosin, inumin ang **unang dosis sa gabi bago matulog** at dahan-dahan tumayo — ang pagbaba ng presyon ng dugo sa unang dosis ay maaaring magdulot ng pagkahilo.
- Huwag doblehin ang dosis kapag nalimutang uminom.

Mahahalagang Paalala sa Kaligtasan

- Tumayo nang **dahan-dahan**, lalo na sa simula, upang maiwasan ang pagkahilo o paghimatay.
- Mag-ingat sa pagsasama ng alpha blockers sa **PDE5 inhibitors** o gamot para sa mababang presyon (maaaring lumala ang pagkahilo).
- Ang **retrograde ejaculation** (bawas o walang lumabas na tamod) ay karaniwan sa tamsulosin/silodosin — hindi mapanganib at maibabalik kapag itinigil ang gamot.

Mga Side Effect

- Pagkahilo o pagiging magaan ang ulo; pagod
- Baradong ilong
- Bawas o “tuyong” ejaculation

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Paghimatay** o matinding pagkahilo
- Mabilis o malakas na tibok ng puso, o sakit sa dibdib
- Hindi kayo makapagihi** (humanap agad ng pag-aalaga)

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

- Ang alpha blockers ay mabilis na nagpapaluwag ng bladder outlet upang mapabuti ang daloy ng ihi sa BPH — ginagamot nito ang mga sintomas ngunit hindi pinaliit ang prostate.
- Tumayo nang dahan-dahan sa simula (pagkahilo), at alamin na ang bawas o tuyong ejaculation ay karaniwan at hindi mapanganib.
- Laging sabihin sa inyong **eye surgeon** bago ang cataract surgery na umiinom o nakainom kayo ng alpha blocker.