

# Ambulatory Urodynamics (Walang Catheter)

Impormasyon para sa Pasyente · Wireless na pagsusuri ng pantog habang ginagawa ang pang-araw-araw na gawain

WARWIKI

Ito ay isang bagong paraan ng pagsusuri ng pantog na walang catheter. Isang maliit na wireless sensor ang inilalagay sa loob ng pantog at sinusukat nito ang presyon habang umihi, gumagalaw, at isinasagawa ang inyong karaniwang gawain — kaya makikita ng pagsubok kung paano talaga gumagana ang inyong pantog, hindi lang sa maikling oras sa klinika.

## Tungkol sa Pagsusuring Ito

Ang karaniwang urodynamics ay gumagamit ng tubo at pinupuno ang pantog ng likido sa klinika. Iba ang pagsubok na ito:

- Isang maliit, malambot na **ring-shaped sensor** ang inilalagay sa pantog sa pamamagitan ng urethra — tatagal lang ng ilang segundo, gamit ang numbing gel.
- Magsusuot kayo ng maliit na **wireless receiver** na nagtatala ng mga sukatan.
- Ang inyong pantog ay mapupuno nang **natural na pagpuno habang umiinom**, at **umihi kayo nang normal** kahit may sensor.

Dahil sinusundan nito ang tunay na pang-araw-araw na gawain, makakatulong ito kapag hindi komportable o hindi malinaw ang karaniwang pagsubok, o kapag pabago-bago ang sintomas. Makapagbibigay din ito ng mas totoong resulta kapag hadlang ang regular na catheter sa pag-ihi.

## Ligtas Ba Ito?

Ang mga unang resulta ay maganda. Ang sensor ay dinisenyo para manatili sa lugar habang umihi at hindi hahadlang sa daloy ng ihi, at walang malubhang problema na nakita sa mga unang pag-aaral. Ang mga panganib ay katulad ng maikling catheter — bahagyang hapdi at maliit na pagkakataon ng impeksiyon sa ihi (UTI). Tandaan na sinusukat lamang ng device na ito ang presyon ng pantog, kaya hindi nito palilitin ang bawat bahagi ng karaniwang pagsubok.

## MGA TERMINO

### Ambulatory

Isinasagawa habang naglalakad at gumagawa ng karaniwang gawain, hindi nakahiga sa klinika.

### Sensor

Ang maliit na ring-shaped na device na inilalagay sa pantog na sumusukat ng presyon.

### Wireless receiver

Isang maliit na unit na isinusuot ninyo na nagtatala ng mga sinusukat ng sensor.

### Walang catheter

Walang tubo na naiwan sa lugar habang isinasagawa ang pagsubok, hindi tulad ng karaniwang urodynamics.

### Natural na pagpuno

Napupuno ang inyong pantog nang mag-isa habang umiinom, sa halip na puno ng likido.

### Umihi (void)

Ang pag-ihi — ginagawa ito nang normal kahit may sensor sa loob.

### Voiding diary

Isang simpleng tala ng inyong pag-inom at pag-ihi na maaaring hilingin sa inyo.

### Urodynamics

Mga pagsubok na sumusukat kung paano nag-iimbak at nagtatanggal ng ihi ang pantog.

**MASAKIT BA?** Ang paglalagay ng sensor ay tatagal lang ng ilang segundo, gamit ang numbing gel, at pakiramdam ay maikling presyon lamang. Karamihan sa mga tao ay halos hindi nararamdaman ang sensor pagkatapos at makakakilos at makakaihiat nang normal. Ang pag-alis ay mabilis — ang sensor ay malumanay na hinihila palabas ng urethra sa pamamagitan ng maliit na sinulid.

## Paano Maghanda (Bago ang Pagsubok)

- Kaunti lang ang kailangan ninyong gawin. Pumunta na handa sa **pag-inom ng likido at pananatili para sa monitoring period** na sinabi ng inyong care team.
- Inumin ang inyong **karaniwang gamot**, ngunit itanong kung kailangang ihinto ang anumang gamot para sa pantog.
- Kung hiniling, **magtago ng simpleng diary** ng inyong pag-inom at pag-ihi sa panahon ng pagsubok.

### Sabihin sa inyong care team nang maaga kung kayo ay:

- May tanda ng **impeksiyon sa ihi** (UTI) (hapdi, lagnat, o makulay at mabahong ihi) — maaaring ipagpaliban ang pagsubok kapag may aktibong impeksiyon
- Umiinom ng blood thinner, o mayroon kayong anumang allergy

## Ano ang Nangyayari Habang ang Pagsubok

- 1 Nililinis ang bukana at inilalagay ang numbing gel.
- 2 Ang maliit na ring sensor ay malumanay na inilalagay sa pantog sa pamamagitan ng urethra, at isinusuot ninyo ang wireless receiver.
- 3 Umiinom kayo ng likido at gumagalaw nang normal habang nagtatala ang sensor; umihi kayo nang normal kapag kailangan.
- 4 Kapag tapos na ang monitoring period, ang sensor ay malumanay na inalis sa pamamagitan ng urethra gamit ang sinulid nito.

## Pagkatapos ng Pagsubok

- Maaari kayong bumalik sa **normal na gawain agad**.
- Maaaring maramdaman ninyo ang **bahagyang hapdi kapag umihi** sa loob ng isang araw. Ang pag-inom ng dagdag na tubig ay nakakatulong at nagpapababa nito.
- Maaaring mapansin ninyo ang **bahagyang pinkong kulay** sa inyong ihi sa maikling panahon. Ito ay karaniwan at karaniwang nawawala sa loob ng isang araw.

### Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panganginig
- Hirap umihi, o hindi talaga kayo makaihi
- Matinding pagdurugo, o mga namuong dugo sa ihi
- Sakit na lumala sa halip na bumuti

## TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ito ay isang walang catheter, wireless na pagsusuri ng pantog — isang maliit na sensor ang nagtatala kung paano gumagana ang inyong pantog sa inyong karaniwang araw.
2. Kaunti lang ang kailangan ninyong ihanda. Pumunta na handa sa pag-inom ng likido at pananatili para sa monitoring period, magtago ng diary kung hiniling, at sabihin sa inyong care team ang mga tanda ng impeksiyon.
3. Ang paglalagay at pag-alis ay tatagal lang ng ilang segundo, at umuwi kayo agad. Ang bahagyang hapdi o kaunting pinkong ihi sa loob ng isang araw ay normal — uminom ng dagdag na tubig, at tumawag para sa lagnat, matinding pagdurugo, o hirap umihi.