

Anticholinergics (para sa Overactive Bladder)

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Mga gamot na nagpapakalma ng pantog

Ang anticholinergics (tinatawag ding antimuscarinics) ay mga gamot na nagpapakalma ng **overactive bladder** (pantog na labis na aktibo), na nagbabawas ng biglaang pangangailangang umihi, madalas na pag-ihi, at hindi makontrol na pag-ihi. Kasama rito ang **oxybutynin, tolterodine, solifenacin, fesoterodine, darifenacin, at trospium** (ang oxybutynin ay mayroon ding patch o gel). Ito ay isang matagal nang ginagamit at epektibong pagpipilian.

Paano Ito Gumagana

Ini-**block** ng gamot ang mga **signal** na nagpapaigting sa kalamnan ng pantog, kaya hindi ito masyadong sumasaklaw nang mabilis habang nagpupuno. Ang resulta ay mas kaunting biglaang pangangailangang umihi at mas bihirang paglalakad sa banyo. Ginagamot nito ang mga sintomas habang iniinom; unti-unting nararamdaman ang bisa sa loob ng ilang linggo.

Ano ang Inaasahan

- Ang pagbabago ay karaniwang nararamdaman sa loob ng **ilang linggo** — bigyan ng oras bago hatukan.
- Karaniwang inumin **isang beses sa isang araw** sa extended-release na anyo.
- Ang **extended-release na pills, patch, o gel** ay karaniwang nagdudulot ng mas kaunting pagkatuyo ng bibig kaysa short-acting oxybutynin.

MGA TERMINO

Overactive bladder (OAB)

Biglaang pangangailangang umihi at madalas na pag-ihi dahil sa pantog na sumasaklaw nang maaga.

Anticholinergic / antimuscarinic

Uri ng gamot na nagpapakalma sa kalamnan ng pantog.

Dry mouth (pagkatuyo ng bibig)

Ang pinakakaraniwang side effect.

Anticholinergic burden

Pinagsanib na epekto ng maraming ganitong gamot — mahalaga para sa mga nakatatanda.

Beta-3 agonist

Ibang uri ng OAB na gamot na may mas kaunting ganitong mga epekto (alternatibo).

Narrow-angle glaucoma

Kondisyon ng mata kung saan karaniwang iniwan ang mga gamot na ito.

PAALALA PARA SA MGA NAKATATANDA Sa mga nakatatandang pasyente, ang mga gamot na ito ay maaaring makaapekto sa **memorya at pag-iisip**, at ang pangmatagalang paggamit ng maraming anticholinergic na gamot nang sabay-sabay ay naiugnay sa mga alalahanin sa cognitive (kaisipan). Kung ito ay isang pag-aalala, ang **beta-3 agonist** ay isang alternatibong OAB na gamot na walang ganitong epekto — itanong sa inyong care team.

Paano Inumin

- Uminom ng **isang beses sa isang araw** ayon sa utos; huwag tigilin nang maaga kahit hindi pa ganap na nawawala ang biglaang pangangailangang umihi.
- Kung abala kayo sa pagkatuyo ng bibig, itanong ang tungkol sa **extended-release na anyo, patch, o gel**.
- Pagsamahin ito sa bladder training at pelvic floor exercises (Kegel) para sa pinakamabuting resulta.

Mahahalagang Paalala sa Kaligtasan

- Karaniwang **iniwasan sa hindi pa naralingang narrow-angle glaucoma** — ipaalam sa inyong care team ang anumang kondisyon ng mata.
- Mag-ingat kung may **hirap sa pag-ihi**, malubhang konstipasyon (paninigas ng dumi), o ilang kondisyon sa tiyan.
- Maaaring mabawasan ang pagpapawis — mag-ingat sa **mainit na panahon** para maiwasan ang labis na init ng katawan.

Mga Side Effect

- **Pagkatuyo ng bibig at konstipasyon** (pinakakaraniwan)
- Malabong paningin, tuyong mata
- Pag-aantok; sa mga nakatatanda, pagkalito

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Hindi makapag-ihi** o pakiramdam na hindi kumpletong naubos ang pantog
- **Bagong pagkalito o problema sa memorya**, lalo na kung nakatatanda
- Malubhang konstipasyon, o **sakit/pamumula ng mata na may malabong paningin**

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Pinapakalma ng anticholinergics ang overactive bladder, binabawasan ang biglaang pangangailangang umihi, madalas na pag-ihi, at hindi makontrol na pag-ihi; bigyan ng ilang linggo.
2. Ang pagkatuyo ng bibig at konstipasyon ay karaniwan — ang extended-release na anyo, patch, o gel ay makakatulong.
3. Sa mga nakatatanda, maaaring maapektuhan ang pag-iisip; ang beta-3 agonist ay isang alternatibo. Tumawag kung hindi kayo makapag-ihi o nagkaroon ng bagong pagkalito.