

Artipisyal na Urinary Sphincter (AUS)

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Ano ang inaasahan bago ang inyong AUS surgery

Ang artipisyal na urinary sphincter (AUS) ay isang maliit na device na inilalagay nang buo sa ilalim ng balat, na nagbabalik ng kontrol sa pantog kapag tumatags ang ihi — kadalasan pagkatapos ng prostate surgery. Kayo mismo ang kumokontrol dito gamit ang isang pump na nakatago sa bayag (scrotum). Inilalarawan ng handout na ito kung paano ito gumagana, paano maghanda, at ano ang inaasahan.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Ang pagtagas ng ihi kapag may aktibidad, pag-ubo, o pag-angat ay tinatawag na **stress incontinence**, at madalas itong nangyayari pagkatapos ng prostate surgery. Ginagamot ito ng AUS gamit ang tatlong magkakaugnay na bahagi, lahat nakatago sa ilalim ng balat:

- Isang malambot na **cuff** sa paligid ng urethra (ang tubo na dinadaan ng ihi) na banayad na pinipisil ito upang manatiling tuyo kayo
- Isang **pump** sa bayag (scrotum) na pinipindot ninyo kapag gusto ninyong umihi
- Isang maliit na **balloon** sa ibabang tiyan na nagtatakda ng presyon

Paano ninyo ito gagamitin: karaniwan ay nakasara ang cuff at pinapanatili kayong tuyo. Kapag kailangan ninyong umihi, pisilin at bitawan ang pump nang ilang beses — magbubukas ang cuff at makakaihi kayo. Pagkalipas ng ilang minuto, awtomatiko itong muling masasara.

Ligtas Ba Ito?

Ang AUS ang pinakakilala at pinaka-epektibong paggamot para sa ganitong uri ng pagtagas ng ihi, at karamihan sa mga lalaki ay nakakamit ng napakagandang kontrol. Tulad ng anumang implant, may ilang panganib — pangunahin ang impeksiyon, o pagkasira ng device o urethra sa paglipas ng panahon na maaaring mangailangan ng susunod na pag-aayos. Binabawasan ng inyong care team ang panganib ng impeksiyon sa pamamagitan ng antibiotics, malinis na pamamaraan, at paggamot ng anumang impeksiyon sa ihi bago ang surgery.

MGA TERMINO

Stress incontinence

Pagtagas ng ihi kapag may aktibidad, pag-ubo, o pag-angat.

Urethra

Ang tubo na nagdadala ng ihi palabas ng katawan.

Cuff

Ang bahagi ng device na banayad na pinipisil ang urethra upang manatiling tuyo kayo.

Pump

Ang bahagi sa bayag (scrotum) na pinipindot ninyo upang mabuksan ang cuff at makaihi.

Activation (pag-i-activate)

Ang pag-on ng device sa isang visit mga 6 linggo pagkatapos ng surgery, kapag gumaling na.

Deactivation (pag-i-deactivate)

Ang pag-off ng device (cuff nakabukas) — kailangan bago ang anumang catheter.

General anesthesia

Gamot na nagpapatulog at nagpapawalang-sakit sa inyo habang surgery.

Cystoscopy

Pagsusuri gamit ang camera sa urethra at pantog, kadalasang ginagawa bago ang surgery.

MASAKIT BA? Ang surgery ay sa ilalim ng general o spinal anesthesia, kaya wala kayong mararamdaman. Pagkatapos, masakit, namamaga, at may pasa ang scrotum at perineum sa loob ng ilang linggo — nakakatulong ang scrotal support, yelo, at pain medicine. Tumatagal ito ng 1–2 oras; marami ang nakakauwi sa araw din.

Paano Maghanda (Bago ang Surgery)

- Isinasagawa sa ilalim ng **general o spinal anesthesia** — sundin ang lahat ng tagubilin (pag-aayuno, gamot na ihihint, kasama ang blood thinners).
- Ang **urine test** ay nagsusuri para sa impeksiyon — dapat munang gamutin ang impeksiyon bago ang surgery, kaya maaaring muling itakda kung mayroon kayo nito.
- Huwag manigarilyo o mag-vape**; maligo gamit ang **antiseptic soap** at uminom ng antibiotics ayon sa utos — prayoridad ang pag-iwas sa impeksiyon.

Sabihin sa inyong care team nang maaga kung kayo ay:

- Nakaranas ng **radiation** sa pelvic area, o nakaraan nang surgery sa urethra o incontinence
- May **diabetes**, o nahihirapan gamitin ang mga kamay (kayo mismo ang nagpapatakbo ng pump)
- May anumang impeksiyon, kahit saan sa katawan

Ano ang Nangyayari Habang Surgery

- Kayo ay natutulog o nangangalay mula baywang pababa sa ilalim ng anesthesia, at ibinibigay ang antibiotics.
- Sa pamamagitan ng maliliit na hiwa, inilalagay ng siruhano ang **cuff** sa paligid ng urethra, ang **balloon** sa ibabang tiyan, at ang **pump** sa bayag — lahat sa ilalim ng balat.
- Pinupunan at sinusubukan ang device, pagkatapos ay **iniwan na naka-off** upang makapagpahinga at gumaling ang lahat.

Pagkatapos ng Surgery

- Magsuot ng scrotal support, gumamit ng yelo, at iwasan ang **mabigat na pag-angat, pag-igting, pagbibisikleta, at pakikipagtalik** hangga't hindi pinapayagan.
- Mananatiling OFF ang device sa loob ng mga 6 na linggo.** Patuloy kayong magtatags ng ihi at gumamit ng pads — normal ito. **Huwag pindutin ang pump** hangga't hindi ini-activate ng siruhano.
- Sa visit mga **6 na linggo, ii-activate ng siruhano ang device** at ituturo kung paano gamitin ang pump.
- Laging sabihin sa doktor o nars na mayroon kayong AUS** — kailangan itong i-deactivate bago ang anumang catheter.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat, panginginig, o lumalaking pamumula, sakit, o pagtatulo sa hiwa
- Biglaang hindi makaihi nang kahit kaunti
- Bayag na nagiging napaka-pamamaga, matigas, o lalong sumasakit

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

- Ang AUS ay nakatagong device na nagbabalik ng kontrol sa pantog — pinananatili kayong tuyo ng cuff; pinipindot ninyo ang pump upang makaihi.
- Mananatili itong **OFF nang mga 6 na linggo** (normal pa rin ang pagtatags), pagkatapos ay ii-activate at ituturo ang paggamit.
- Ang pag-iwas sa impeksiyon ang pinakamahalaga: gamutin muna ang anumang impeksiyon, huwag manigarilyo, gumamit ng antiseptic wash at antibiotics.