

5-Alpha-Reductase Inhibitors (प्रोस्टेट छोटा करने वाली गोलियाँ)

WARWIKI

रोगी जानकारी · बड़े हुए प्रोस्टेट को धीरे-धीरे छोटा करने वाली गोलियाँ

5-alpha-reductase inhibitors (5-ARI) ऐसी गोलियाँ हैं जो बड़े हुए प्रोस्टेट (BPH) को धीरे-धीरे छोटा करती हैं, पेशाब के बहाव को बेहतर बनाती हैं और समय के साथ मूत्र अवरोध तथा सर्जरी की ज़रूरत कम करती हैं। दो दवाएँ हैं: **finasteride (Proscar)** और **dutasteride (Avodart)**। इनका असर धीरे-धीरे होता है — कई महीने दीजिए।

यह कैसे काम करती है

ये गोलियाँ शरीर में टेस्टोस्टेरोन को **DHT** में बदलने से रोकती हैं। DHT ही प्रोस्टेट को बढ़ाने वाला हार्मोन है। कम DHT से प्रोस्टेट **धीरे-धीरे छोटा** होता है और पेशाब की नली चौड़ी होती है। पूरा फ़ायदा **3–6 महीने** में दिखता है — यह जल्दी असर करने वाली दवा नहीं है और अक्सर इसे तेज़ी से काम करने वाले alpha blocker के साथ दिया जाता है।

क्या उम्मीद करें

- **बड़े** प्रोस्टेट में सबसे अधिक फ़ायदा; असर महीनों में बनता है।
- **रोज़ एक बार** लेनी होती है, लंबे समय तक।
- समय के साथ मूत्र अवरोध और प्रोस्टेट सर्जरी का खतरा कम होता है।

शब्दों को समझें

5-ARI

5-alpha-reductase inhibitor (finasteride, dutasteride)।

BPH

बढ़ा हुआ प्रोस्टेट।

DHT

प्रोस्टेट बढ़ाने वाला हार्मोन; ये गोलियाँ इसे कम करती हैं।

PSA

प्रोस्टेट का blood test; ये गोलियाँ इसे लगभग आधा कर देती हैं।

मूत्र अवरोध

पेशाब बिल्कुल न हो पाना — इसका खतरा समय के साथ कम होता है।

Finasteride / dutasteride

इस दवा वर्ग की दो दवाएँ।

यह आपके PSA test को प्रभावित करती है। ये गोलियाँ आपके PSA blood level को लगभग आधा कर देती हैं। इससे आपको नुकसान नहीं है, लेकिन डॉक्टर को यह पता होना चाहिए ताकि prostate cancer screening सही तरह पढ़ी जाए — आमतौर पर PSA को दोगुना करके सामान्य से तुलना की जाती है। हर डॉक्टर को बताएँ कि आप यह दवा ले रहे हैं।

कैसे लें

- रोज़ एक बार, लगभग एक ही समय पर; धैर्य रखें — असर में महीने लगते हैं।
- शुरुआत में बदलाव न दिखे तो दवा बंद न करें।
- प्रोस्टेट को छोटा रखने के लिए अक्सर लंबे समय तक जारी रखी जाती है।

ज़रूरी सुरक्षा

- गर्भवती महिलाएँ टूटी या कुचली गोली न छुएँ (पुरुष भ्रूण को खतरा); पूरी कोटेड गोली छूना ठीक है।
- दवा लेते समय और रोकने के बाद कुछ समय तक रक्तदान न करें।
- मूड बदलाव या डिप्रेशन हो तो अपनी चिकित्सा टीम को बताएँ।

सामान्य दुष्प्रभाव

- यौन इच्छा कम होना, स्तंभन दोष (ED), या कम वीर्यपात
- स्तन में दर्द या सूजन
- कुछ पुरुषों में यौन दुष्प्रभाव बने रह सकते हैं — कोई चिंता हो तो चर्चा करें

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- स्तन में गाँठ, दर्द, या निप्पल से स्राव
- नया डिप्रेशन या मूड बदलाव
- पेशाब बिल्कुल न हो पाए (तुरंत देखभाल लें)

याद रखने योग्य तीन बातें

1. 5-ARI प्रोस्टेट को धीरे-धीरे छोटा कर पेशाब बेहतर बनाती और अवरोध व सर्जरी का खतरा कम करती है — 3-6 महीने दीजिए।
2. यह दवा आपका PSA लगभग आधा कर देती है — डॉक्टर को बताएँ ताकि prostate cancer screening सही पढ़ी जाए।
3. गर्भवती महिलाएँ टूटी गोली न छुएँ, रक्तदान न करें, और स्तन बदलाव या डिप्रेशन की सूचना दें।