

अधिग्रहीत दबा हुआ लिंग & इसकी मरम्मत

WARWIKI

रोगी जानकारी · जब लिंग छुप जाता है और सर्जरी उसे कैसे ठीक करती है

अधिग्रहीत दबा हुआ लिंग वह स्थिति है जब वयस्कता में लिंग पेट के निचले हिस्से, अंडकोष या जाँघ की त्वचा और चर्बी के नीचे छुप जाता है। इससे सफाई में परेशानी, बार-बार त्वचा संक्रमण, खड़े होकर पेशाब करने में कठिनाई और यौन समस्याएँ हो सकती हैं। यह एक पहचानी हुई, उपचार योग्य पुनर्निर्माण समस्या है — सर्जरी से लिंग को मुक्त और बहाल किया जा सकता है।

इस स्थिति के बारे में

“अधिग्रहीत” का अर्थ है यह वयस्कता में हुआ (कुछ बच्चों में जो दबा हुआ लिंग होता है, वह हानिरहित होता है)। सामान्य कारणों में **वज़न बढ़ना** और पेट के निचले हिस्से की चर्बी, पूर्व खतना या सर्जरी से निशान, पुरानी त्वचा सूजन (**lymphedema**), और **lichen sclerosus** नामक निशान बनाने वाला त्वचा रोग शामिल हैं।

यह एक कठिन चक्र बना देता है:

- दबी त्वचा नम रहती है और **सूजन व संक्रमण** का शिकार होती है।
- दबी त्वचा पर पेशाब छिड़कने से जलन और निशान बढ़ते हैं।
- इससे समय के साथ सफाई, पेशाब और यौन संबंध और कठिन हो जाते हैं।

मरम्मत क्यों मददगार है

सर्जरी का उद्देश्य **लिंग को मुक्त करना**, रोगग्रस्त त्वचा हटाना और स्वस्थ आवरण पुनर्निर्मित करना है ताकि आप खड़े होकर पेशाब कर सकें, सफाई रख सकें और सामान्य गतिविधि फिर शुरू कर सकें — मरम्मत के बाद संतुष्टि आम तौर पर अच्छी होती है।

शब्दों को समझें

दबा (छुपा) हुआ लिंग

लिंग जो आसपास की त्वचा और चर्बी में छुप जाता है।

Panniculectomy

पेट के निचले हिस्से की लटकती चर्बी/त्वचा हटाना।

Escutcheonectomy

लिंग के ऊपर की चर्बी हटाना।

Skin graft

लिंग की बाहरी सतह ढकने के लिए स्वस्थ त्वचा लगाना।

Lichen sclerosus

निशान बनाने वाला त्वचा रोग जो इसे पैदा या बढ़ा सकता है।

Lymphedema

पुरानी त्वचा सूजन जो लिंग को दबा सकती है।

क्या मुझे पहले वजन कम करना होगा? अक्सर हाँ — वजन से जुड़े दबे लिंग में वजन कम करने (कभी-कभी bariatric रेफरल से) से परिणाम और स्थायित्व बेहतर होते हैं, इसलिए आपकी टीम सर्जरी से पहले या साथ-साथ यह सलाह दे सकती है। सर्जरी में ही **भारी चर्बी का पैड हटा** दिया जाता है।

सर्जरी कैसे की जाती है

- 1 लिंग को उसे दबाए रखने वाले निशान और ऊतक से **मुक्त** किया जाता है।
- 2 रोगग्रस्त या निशानी त्वचा हटाई जाती है; अक्सर **skin graft** से सतह नई बनाई जाती है।
- 3 लटकती चर्बी/त्वचा हटाई जाती है (**panniculectomy / escutcheonectomy**); अंडकोष को भी आकार दिया जा सकता है।
- 4 यह कभी-कभी **चरणों में** की जाती है; catheter और drain सामान्य हैं।

तैयारी कैसे करें

- **वजन सुधार** (संभवतः bariatric रेफरल) और **धूम्रपान बंद करें** — दोनों उपचार पर बहुत असर डालते हैं।
- पहले किसी भी सक्रिय त्वचा संक्रमण का इलाज करें; एनेस्थीसिया निर्देशों का पालन करें।
- घर पर सहायता और छुट्टी का प्रबंध करें — ठीक होने में समय लगता है।

बाद में

- **अस्पताल में रहना**, catheter और कुछ समय के लिए drain की उम्मीद रखें।
- यदि graft लगाया गया है, **उसकी रक्षा करें** — निर्देशानुसार उस हिस्से पर दबाव/बैठना न डालें।
- घाव की देखभाल और धीरे-धीरे गतिविधि बढ़ाएँ; वजन नियंत्रण परिणाम को सुरक्षित रखता है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार, फैलती लालिमा, या बदबूदार साव (संक्रमण)
- Graft या घाव का **काला** पड़ना, खुलना, या अत्यधिक रक्तसाव
- आप **पेशाब नहीं कर पा रहे**, या catheter से पेशाब आना बंद हो गया

याद रखने योग्य तीन बातें

1. अधिग्रहीत दबा हुआ लिंग त्वचा और चर्बी के नीचे छुप जाता है, जिससे सफाई, पेशाब, संक्रमण और यौन समस्याएँ होती हैं — और इसे ठीक किया जा सकता है।
2. मरम्मत में लिंग को मुक्त करना, रोगग्रस्त त्वचा हटाना (अक्सर graft से) और भारी चर्बी हटाना शामिल है; यह चरणों में हो सकती है।
3. वजन कम करना और धूम्रपान न करना परिणाम बेहतर बनाते हैं। बुखार, graft का काला पड़ना, या पेशाब में परेशानी पर तुरंत बुलाएँ।