

Anticholinergics (अति सक्रिय मूत्राशय के लिए)

WARWIKI

रोगी जानकारी · दवाएँ जो मूत्राशय की असामयिक सिकुड़न को कम करती हैं

Anticholinergics (जिन्हें antimuscarinics भी कहते हैं) दवाएँ हैं जो अति सक्रिय मूत्राशय (OAB) को शांत करती हैं — अचानक पेशाब की तीव्र इच्छा, बार-बार पेशाब और तीव्र इच्छा असंयम को कम करती हैं। आम दवाएँ हैं: **oxybutynin**, **tolterodine**, **solifenacin**, **fesoterodine**, **darifenacin**, और **trospium** (oxybutynin patch या gel के रूप में भी मिलती है)।

यह कैसे काम करती है

ये दवाएँ उन **संकेतों को रोकती हैं** जो मूत्राशय की मांसपेशी को सिकोड़ते हैं, जिससे भरते समय मूत्राशय कम और कम अचानक सिकुड़ता है। परिणाम — कम तीव्र इच्छा और कम बार पेशाब। लाभ कुछ हफ्तों में दिखने लगता है।

क्या उम्मीद करें

- सुधार आमतौर पर **कुछ हफ्तों में** — आँकने से पहले समय दें।
- अधिकांश extended-release रूपों में **दिन में एक बार** लें।
- **Extended-release pill, patch या gel** में short-acting oxybutynin से कम मुँह सूखता है।

शब्दों को समझें

अति सक्रिय मूत्राशय (OAB)

मूत्राशय के जल्दी सिकुड़ने से पेशाब की तीव्र इच्छा और बार-बार पेशाब।

Anticholinergic / antimuscarinic

दवाओं का वह वर्ग जो मूत्राशय की मांसपेशी को शांत करता है।

मुँह सूखना (Dry mouth)

सबसे आम दुष्प्रभाव।

Anticholinergic burden

ऐसी कई दवाओं का मिला-जुला प्रभाव — बुजुर्गों में विशेष ध्यान देने योग्य।

Beta-3 agonist

OAB की एक अलग दवा जिसके ये दुष्प्रभाव कम हैं (एक विकल्प)।

Narrow-angle glaucoma

आँख की एक स्थिति जिसमें ये दवाएँ आमतौर पर नहीं दी जातीं।

बुजुर्गों के लिए एक ज़रूरी बात बुजुर्गों में ये दवाएँ **याददाश्त और सोचने की क्षमता** को प्रभावित कर सकती हैं। कई anticholinergic दवाओं का लंबे समय तक उपयोग संज्ञानात्मक चिंताओं से जोड़ा गया है। यदि यह चिंता हो, तो **beta-3 agonist** एक विकल्प है जिसका यह प्रभाव नहीं होता — अपनी टीम से पूछें।

कैसे लें

- निर्देशानुसार **दिन में एक बार** लें; केवल इसलिए बंद न करें कि तीव्र इच्छा पूरी तरह ठीक नहीं हुई।
- यदि मुँह सूखना परेशान करे, **extended-release रूप, patch या gel** के बारे में पूछें।
- सर्वोत्तम परिणाम के लिए मूत्राशय प्रशिक्षण और पेल्विक फ्लोर व्यायाम (केगेल) साथ करें।

ज़रूरी सुरक्षा

- बिना इलाज के **narrow-angle glaucoma** में आमतौर पर नहीं दी जाती — अपनी टीम को आँख की किसी भी स्थिति के बारे में बताएँ।
- यदि **मूत्राशय खाली करने में कठिनाई**, गंभीर कब्ज या पेट की कुछ समस्याएँ हों तो सावधानी बरतें।
- ये पसीना कम कर सकती हैं — **गर्म मौसम** में ज़्यादा गर्मी से बचें।

सामान्य दुष्प्रभाव

- मुँह सूखना** और **कब्ज** (सबसे आम)
- धुंधली दृष्टि, आँखें सूखना
- नींद आना; बुजुर्गों में भ्रम

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- आप **पेशाब नहीं कर पा रहे** या लगे कि मूत्राशय खाली नहीं हुआ
- नई भूलने की समस्या या भ्रम**, विशेषकर बुजुर्गों में
- गंभीर कब्ज, या **आँख में दर्द/लालिमा के साथ धुंधली दृष्टि**

याद रखने योग्य तीन बातें

- Anticholinergics OAB को शांत करती हैं — तीव्र इच्छा, बार-बार पेशाब और असंयम कम होता है; कुछ हफ्ते समय दें।
- मुँह सूखना और कब्ज आम हैं — extended-release रूप, patch या gel से राहत मिल सकती है।
- बुजुर्गों में सोचने की क्षमता प्रभावित हो सकती है; beta-3 agonist एक विकल्प है। पेशाब न हो या भ्रम हो तो टीम को बुलाएँ।