

# Liệu Pháp Thay Thế Testosterone (Nam giới)

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Điều trị testosterone thấp đã được xác nhận kèm triệu chứng

Liệu pháp thay thế testosterone (TRT) điều trị cho nam giới có **cả hai yếu tố**: nồng độ testosterone thấp đã được xác nhận và các triệu chứng đi kèm — chẳng hạn như giảm ham muốn, mệt mỏi, tâm trạng kém, hoặc giảm cơ bắp và khả năng cương dương. TRT giúp đưa testosterone về mức bình thường bằng gel, tiêm, miếng dán, hoặc viên nang cấy dưới da. TRT **không** phải là liệu pháp “chống lão hóa” và không dùng khi nồng độ testosterone bình thường.

## Cơ chế hoạt động & Đối tượng phù hợp

Testosterone thấp (suy sinh dục — hypogonadism) được chẩn đoán khi có **hai xét nghiệm máu buổi sáng** cho kết quả thấp kèm theo triệu chứng — chỉ một kết quả thấp là chưa đủ. Khi cả hai yếu tố cùng hiện diện, TRT có thể cải thiện năng lượng, ham muốn, tâm trạng và cơ bắp trong vài tuần đến vài tháng.

## Các dạng bào chế

- **Gel hoặc dung dịch** — thoa mỗi ngày (cần tránh tiếp xúc da trực tiếp với phụ nữ và trẻ em).
- **Tiêm** — mỗi 1–2 tuần, hoặc dạng tác dụng kéo dài mỗi ~10 tuần.
- **Miếng dán, viên nang cấy dưới da** (mỗi 3–6 tháng), hoặc gel xịt mũi.

## GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

### Testosterone

Hormone nam chính; ảnh hưởng đến ham muốn, năng lượng, tâm trạng và cơ bắp.

### Suy sinh dục (Hypogonadism)

Testosterone thấp đã được xác nhận.

### Hematocrit

Chỉ số máu mà TRT có thể làm tăng — cần được theo dõi.

### PSA

Xét nghiệm máu tuyến tiền liệt, kiểm tra trước và trong quá trình điều trị.

### Khả năng sinh sản

TRT làm giảm sản xuất tinh trùng — quan trọng nếu bạn muốn có con.

### Chuyển gel

Gel dính vào người khác — che vùng thoa và rửa tay sau khi dùng.

**DỰ ĐỊNH CÓ CON?** Hãy nói với nhóm chăm sóc trước. TRT **làm giảm sản xuất tinh trùng và có thể gây vô sinh** — đôi khi kéo dài. Nếu khả năng sinh sản quan trọng với bạn, có những phương pháp điều trị khác giúp tăng testosterone mà vẫn bảo vệ tinh trùng. Đừng bắt đầu TRT mà không thảo luận điều này trước.

## Theo dõi (Quan trọng)

TRT cần kiểm tra định kỳ và xét nghiệm máu:

- **Nồng độ testosterone** — để xác nhận bạn đang trong giới hạn bình thường.
- **Hematocrit** — TRT có thể làm đặc máu; nếu quá cao, liều sẽ được điều chỉnh hoặc tạm dừng.
- **PSA / tuyến tiền liệt** — kiểm tra trước và trong quá trình điều trị; không bắt đầu TRT khi có ung thư tuyến tiền liệt chưa được điều trị.

## Sử dụng an toàn

- **Gel:** thoa theo hướng dẫn, để khô, che vùng thoa và rửa tay — tránh tiếp xúc với phụ nữ/trẻ em.
- Không tự thay đổi liều; đi xét nghiệm máu đúng hẹn.
- Thông báo cho nhóm chăm sóc về bệnh tim mạch hoặc **ngưng thở khi ngủ** (TRT có thể làm nặng thêm).

## Tác dụng phụ thường gặp

- Mụn trứng cá, da dầu, giữ nước
- Ngực căng; tinh hoàn nhỏ lại; giảm khả năng sinh sản
- Tăng hồng cầu (có thể cần theo dõi hoặc lấy máu)

**Hãy gọi cho nhóm chăm sóc hoặc đến cơ sở y tế nếu bạn có:**

- Đau ngực, sưng/đau chân, hoặc khó thở
- Đau đầu dữ dội, thay đổi thị lực, hoặc triệu chứng máu đặc/bừng nóng rõ rệt
- Rối loạn tiểu tiện mới xuất hiện hoặc lo ngại về tuyến tiền liệt

## BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. TRT dành cho nam giới có **testosterone thấp đã xác nhận kèm triệu chứng** — không dùng khi nồng độ bình thường hoặc để chống lão hóa.
2. TRT **làm giảm khả năng sinh sản** — nói với nhóm chăm sóc trước khi bắt đầu nếu bạn có thể muốn có con.
3. Cần theo dõi thường xuyên (testosterone, số lượng máu, tuyến tiền liệt). Với gel, tránh để gel dính vào người khác.