

Đánh Giá Niệu Quản Dưới Gây Mê

Thông tin cho bệnh nhân · Xác định vị trí hẹp niệu quản trước khi phẫu thuật

WARWIKI

Đây là kiểm tra chuyên sâu niệu quản — ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang — được thực hiện khi bạn đang ngủ dưới gây mê. Bác sĩ kết hợp một số xét nghiệm để xác định chính xác vị trí và độ dài chỗ hẹp, từ đó lên kế hoạch phẫu thuật phù hợp.

Về xét nghiệm này

Chỗ hẹp (gọi là **hẹp niệu quản**) rất khó đo từ bên ngoài, vì vậy bác sĩ sẽ quan sát trực tiếp khi bạn đang ngủ. Tùy vào nhu cầu, buổi kiểm tra có thể dùng **kết hợp bất kỳ** phương pháp nào sau đây:

- **Nội soi niệu quản** — một ống nội soi mảnh, mềm được đưa lên niệu quản để quan sát bên trong.
- **Chụp bể thận xuôi chiều (từ dưới lên)** — thuốc cản quang được bơm *lên* niệu quản từ bàng quang, kết hợp chụp X-quang để hiển thị lòng ống.
- **Chụp bể thận ngược chiều (từ trên xuống)** — nếu bạn có ống dẫn lưu thận, thuốc cản quang được chạy *xuống* từ trên, qua chỗ hẹp.
- **Nội soi bàng quang / chụp bàng quang** — quan sát bàng quang và chụp X-quang bàng quang.

Mục tiêu là lập bản đồ chính xác — vị trí, độ dài và mức độ hẹp. Một **ống thông JJ (stent)** hoặc ống dẫn lưu thận có thể được đặt hoặc thay trong cùng buổi.

Có an toàn không?

Có. Đây là xét nghiệm phổ biến, ít rủi ro. Phần lớn bệnh nhân chỉ có tiểu ra máu nhẹ, cảm giác rát khi tiểu, hoặc đau âm ỉ vùng sườn sau đó. Các vấn đề không thường gặp gồm nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc kích thích niệu quản thoáng qua; tổn thương niệu quản nhỏ hiếm khi xảy ra. Gây mê nhìn chung rất an toàn.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Niệu quản

Ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang.

Hẹp niệu quản

Chỗ có sẹo, bị thu hẹp làm cản trở dòng chảy nước tiểu.

Nội soi niệu quản

Quan sát bên trong niệu quản bằng ống nội soi mảnh, mềm.

Chụp bể thận từ dưới lên

X-quang niệu quản và thận sau khi bơm thuốc cản quang lên từ bàng quang.

Chụp bể thận từ trên xuống

X-quang sau khi chạy thuốc cản quang xuống từ ống dẫn lưu thận.

Ống dẫn lưu thận (nephrostomy)

Ống dẫn lưu thận ra ngoài qua lưng; thuốc cản quang có thể bơm qua đây.

Thuốc cản quang

Chất lỏng hiện màu trắng trên X-quang để hiển thị lòng ống.

Ống thông JJ (stent)

Ống nội trong mềm giữ niệu quản mở; có thể được đặt hoặc thay.

CÓ ĐAU KHÔNG? Bạn đang ngủ dưới gây mê nên không cảm thấy gì trong suốt quá trình. Sau đó, có thể bị rất nhẹ khi tiểu, đau âm ỉ vùng sườn, hoặc nước tiểu hơi hồng trong một đến hai ngày. Đây là thủ thuật ngắn và thường được về nhà trong ngày.

Cách chuẩn bị (Trước xét nghiệm)

- Thủ thuật được thực hiện dưới **gây mê** — tuân thủ mọi hướng dẫn trước phẫu thuật (nhịn ăn và tạm dừng các thuốc được dặn, kể cả thuốc làm loãng máu).
- **Xét nghiệm nước tiểu** kiểm tra nhiễm trùng — nếu đang bị nhiễm trùng cần điều trị trước.
- Giữ nguyên **ống dẫn lưu thận hoặc ống thông JJ** hiện có, và **nhờ người đưa về nhà**.

Báo cho nhóm chăm sóc trước buổi hẹn nếu bạn:

- Từng có phản ứng với **thuốc cản quang X-quang hoặc iốt**
- Đang dùng **thuốc làm loãng máu**, hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng tiểu

Quá trình thực hiện

- 1 Bạn được gây mê và tiêm kháng sinh phòng ngừa.
- 2 Ống nội soi bàng quang được đưa vào. Thuốc cản quang được bơm lên niệu quản trong khi chụp X-quang, và/hoặc ống nội soi được đưa lên niệu quản để quan sát bên trong.
- 3 Nếu bạn có ống dẫn lưu thận, thuốc cản quang có thể được chạy xuống từ trên để quan sát chỗ hẹp từ cả hai phía.
- 4 Kết quả được ghi lại, và ống thông JJ hoặc ống dẫn lưu thận được đặt hoặc thay nếu cần.

Sau xét nghiệm

- Bạn hồi tỉnh sau gây mê và thường **về nhà trong ngày** cùng người đưa đón.
- Có thể cảm thấy **rất nhẹ, đau âm ỉ vùng sườn, hoặc nước tiểu hơi hồng** trong một đến hai ngày. Uống nhiều nước giúp cải thiện.
- Nếu đặt ống thông JJ, cảm giác tiểu gấp hoặc khó chịu nhẹ khi tiểu là bình thường.
- Bác sĩ xem xét kết quả và thảo luận các bước tiếp theo cho ca phẫu thuật của bạn.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh
- Đau vùng sườn hoặc bụng dữ dội hoặc ngày càng nặng hơn
- Chảy máu nhiều hoặc có cục máu đông trong nước tiểu
- Khó tiểu, hoặc buồn nôn và nôn kéo dài

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Xét nghiệm này lập bản đồ chỗ hẹp niệu quản khi bạn đang ngủ, dùng ống nội soi nhỏ và thuốc cản quang từ dưới lên và/hoặc từ trên xuống, để bác sĩ lên kế hoạch phẫu thuật phù hợp.
2. Vì có gây mê, hãy tuân thủ hướng dẫn nhịn ăn và dùng thuốc, điều trị nhiễm trùng trước, giữ nguyên ống dẫn lưu thận hoặc ống thông JJ hiện có, và nhờ người đưa về.
3. Phần lớn bệnh nhân về nhà trong ngày. Rất nhẹ, đau âm ỉ vùng sườn, hoặc nước tiểu hơi hồng trong một đến hai ngày là bình thường — uống nhiều nước, và gọi cho nhóm chăm sóc nếu sốt, đau dữ dội, hoặc chảy máu nhiều.