

Tiêm Chất Làm Đầy Niệu Đạo

Thông tin cho bệnh nhân · Thủ thuật tiêm tại phòng khám điều trị tiểu không kiểm soát khi gắng sức

WARWIKI

Tiêm chất làm đầy niệu đạo là phương pháp điều trị ít xâm lấn dành cho **tiểu không kiểm soát khi gắng sức** — tức là bị rò rỉ nước tiểu khi ho, cười hoặc vận động. Chất liệu mềm được tiêm quanh niệu đạo giúp niệu đạo đóng kín hơn, giảm lượng nước tiểu thoát ra khi áp lực tăng. Thủ thuật nhanh, không cần rạch da, và có thể là lựa chọn thay thế hoặc bước trung gian trước khi phẫu thuật đặt băng nâng (sling).

Cơ chế hoạt động

Chất làm đầy được tiêm vào thành niệu đạo tại một vài điểm, **làm phồng thành niệu đạo** lên để ống dẫn nước tiểu đóng kín hơn. Khi niệu đạo được bịt kín tốt hơn, áp lực đột ngột từ ổ bụng ít có khả năng đẩy nước tiểu ra ngoài.

Phương pháp này có phù hợp với tôi không?

- Lựa chọn tốt nếu bạn muốn điều trị **nhANH, ít rủi ro** mà không cần phẫu thuật
- Phù hợp với những người không thể thực hiện hoặc muốn tránh phẫu thuật đặt băng nâng
- Có thể là **giải pháp tạm thời** trước khi quyết định phẫu thuật

Hiệu quả thường **kém bền vững hơn** so với băng nâng và có thể **tiêm lại** nếu hiệu quả giảm dần theo thời gian.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Tiểu không kiểm soát khi gắng sức

Rò rỉ nước tiểu khi tăng áp lực — ho, cười, nâng vật nặng, tập thể dục.

Chất làm đầy

Chất liệu mềm được tiêm vào để làm phồng thành niệu đạo.

Niệu đạo

Ống dẫn nước tiểu ra khỏi cơ thể.

Ống nội soi (cystoscope)

Camera mỏng dùng để hướng dẫn mũi tiêm.

Băng nâng (sling)

Dài đỡ đặt dưới niệu đạo qua phẫu thuật — giải pháp bền vững hơn.

CÓ ĐAU KHÔNG? Đây thường là **thủ thuật tại phòng khám có gây tê tại chỗ**, kéo dài khoảng 10–15 phút. Hầu hết bệnh nhân chỉ cảm thấy áp lực nhẹ và có thể về nhà ngay trong ngày, nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường. Cảm giác rất nhẹ sau thủ thuật là bình thường.

Cách chuẩn bị

- **Xét nghiệm nước tiểu** để loại trừ nhiễm trùng trước thủ thuật
- Thông báo cho nhóm chăm sóc về **thuốc làm loãng máu** và dị ứng thuốc
- Không cần chuẩn bị nhiều — thông thường bạn có thể tự lái xe về nhà

Quá trình thực hiện

- 1 Thuốc gây tê được bôi/tiêm tại chỗ.
- 2 Ống nội soi mỏng được đưa vào để quan sát niệu đạo.
- 3 Chất làm đầy được tiêm vào một vài điểm quanh niệu đạo.
- 4 Rút ống nội soi ra; bạn đi tiểu trước khi về.

Sau thủ thuật

- Cảm giác rất nhẹ, tiểu gấp hoặc ít máu trong nước tiểu trong một hoặc hai ngày là bình thường.
- Bạn có thể gặp **khó khăn tạm thời khi đi tiểu** ngay sau thủ thuật — thường tự hết nhanh.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- **Không tiểu được** sau thủ thuật
- Sốt hoặc ớn lạnh (có thể nhiễm trùng)
- Chảy máu nhiều hoặc đau ngày càng tăng

Điều nên biết

- Hiệu quả đầy đủ thường thấy rõ trong vài tuần.
- Nếu tình trạng rò rỉ trở lại theo thời gian, có thể **tiêm lại**.
- Phẫu thuật đặt băng nâng vẫn là lựa chọn sau này nếu bạn muốn điều trị lâu dài hơn.

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Tiêm chất làm đầy niệu đạo là thủ thuật tiêm nhanh, không rạch da, giúp niệu đạo đóng kín hơn và giảm tiểu không kiểm soát khi gắng sức.
2. Hiệu quả kém bền hơn băng nâng và có thể không chữa khỏi hoàn toàn, nhưng ít rủi ro và có thể tiêm lại.
3. Hồi phục nhanh. Gọi ngay nếu bạn không tiểu được hoặc bị sốt sau thủ thuật.