

ProACT Adjustable Balloons (para sa Mga Lalaki)

Impormasyon para sa Pasyente · Dalawang nababagong balloon na sumusuporta sa urethra pagkatapos ng prostatectomy

WARWIKI

Ang ProACT ay isang maliit na **nababago** (adjustable) na implant para sa mga lalaking may pagtagas ng ihi kapag may diin (stress urinary incontinence) pagkatapos ng prostatectomy. Dalawang maliit na silicone balloon ang inilalagay sa magkabilang panig ng urethra, malapit sa bladder neck, upang magbigay ng malambot na suporta at mapabuti ang kontrol. Mahalagang katangian: ang mga balloon ay maaaring **i-ayos sa opisina** pagkatapos ng operasyon — nagdadagdag o nag-aalis ng kaunting tubig hanggang tamang-tama na.

Paano Ito Gumagana

Pagkatapos ng prostatectomy, maaaring humina ang kalamnan na nagtatago ng ihi. Ang dalawang balloon ay nagbibigay ng malambot na suporta sa **bladder neck** upang mas mahusay na magsara ang urethra kapag umubo, nagbubuhat, o gumagalaw — **nang hindi** tuluyang sinisikip ito. Bawat balloon ay konektado sa isang maliit na **port** sa ilalim ng balat ng scrotum, na ginagamit ng inyong siruhano para i-ayos ang laman.

Angkop Ba Ito sa Akin?

- Pagpipilian para sa **banayad hanggang katamtamang** pagtagas pagkatapos ng prostatectomy
- Mabuti kung gusto ng minimally invasive, **nababago at naaalis** na opsyon, o nais iwasan / hindi angkop sa artificial urinary sphincter (AUS)
- Hindi gaanong angkop sa **malubhang** pagtagas, at **karaniwang hindi inirekomenda pagkatapos ng pelvic radiation** (mas mababang tagumpay, mas mataas na panganib na mabusog ang tissue)
- Maaari itong maging unang hakbang — ang ilang lalaki ay pumipili pa rin ng AUS sa bandang huli

MGA TERMINO

Stress incontinence

Pagtagas ng ihi kapag umubo, nagbubuhat, o nag-eehersisyo.

Bladder neck

Ang bahagi kung saan nagtatagpo ang pantog at urethra.

Balloon

Maliit na silicone balloon na nagbibigay ng malambot, nababagong suporta.

Port

Maliit na valve sa ilalim ng balat ng scrotum para i-ayos ang balloon.

Titration

Pagdaragdag o pag-aalis ng tubig sa balloon sa ilang pagbisita sa opisina.

AUS

Artificial urinary sphincter — ibang uri ng implant na gumagamit ng cuff.

MASAKIT BA? Ang mga balloon ay inilalagay sa isang **maikling operasyon** sa ilalim ng anesthesia (general, spinal, o local na may sedation), kadalasan bilang **day procedure** sa pamamagitan ng dalawang maliliit na butas — walang malaking hiwa. Pagkatapos ay maaaring maramdaman ang paninikip at pamamaga nang ilang araw. Ang mga susunod na pag-aayos sa opisina ay mabilis at gumagamit ng maliit na karayom sa port.

Paano Ito Isinasagawa

- 1 Sa ilalim ng anesthesia, gamit ang **X-ray, ultrasound, o scope** bilang gabay, naglalagay ang siruhano ng isang balloon sa **bawat panig** ng urethra sa bladder neck sa pamamagitan ng maliliit na butas.
- 2 Ang mga konektadong tubo ay inilalagay sa **dalawang port** sa ilalim ng balat ng scrotum.
- 3 Halos walang laman ang mga balloon sa simula at iiwan upang maghilom.

Pag-aayos ng Device

- Ilang linggo pagkatapos, magdadagdag ang inyong care team ng kaunting tubig sa pamamagitan ng scrotal port **sa opisina** — mabilis na tuklaw ng karayom, walang operasyon.
- Inuulit sa ilang pagbisita hanggang magkamit ng magandang kontrol **nang hindi mahirap umihi**.
- Maaaring dagdagan o bawasan anumang oras; maaari ring **alisin** ang buong device kung kinakailangan.

Pagkatapos

- Banayad na paninikip, pamamaga, o pasa nang ilang araw; iwasang mag-angat ng mabigat at sumakay sa bisikleta o kabayo sa ilang sandali.
- Unti-unting bumubuti ang pagtagas habang inaayos ang mga balloon — hindi palaging agad-agad.
- Sabihin sa anumang susunod na siruhano o imaging team na mayroon kayong implant.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Hirap umihi** o hindi makalabas ng ihi (maaaring masyadong puno ang balloon, o pamamaga)
- Lagnat, tumitinding sakit, pamumula, o tagas sa butas (posibleng impeksiyon)
- Biglaang pagkawala ng bisa, o dugo sa ihi

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Gumagamit ang ProACT ng dalawang nababagong balloon para suportahan ang urethra at bawasan ang pagtagas pagkatapos ng prostatectomy — minimally invasive at naalis.
2. Inilalagay ito sa pamamagitan ng maliliit na butas, pagkatapos ay inaayos sa opisina sa ilang pagbisita sa pamamagitan ng scrotal port.
3. Pinakamainam para sa banayad hanggang katamtamang pagtagas na hindi pa naadikal ng radiation; tumawag agad kung hindi kayo makapagihi o may tanda ng impeksiyon.