

Pubosymphyseal Fistula (Fistula sa Ihi–Pubic Bone)

Impormasyon para sa Pasyente · Kapag ang ihi ay kumukulo sa pubic bone (buto sa ari), nagdudulot ng sakit at impeksiyon

WARWIKI

Ang pubosymphyseal fistula (tinatawag din na urosymphyseal fistula) ay isang abnormal na koneksyon sa pagitan ng **daanan ng ihi** (bladder neck o urethra) at ng **pubic symphysis** — ang kasukasuan sa harapan ng pelvis — na kadalasang may kasamang impeksiyon ng buto. Nagdudulot ito ng matinding sakit sa ari o singit at hirap sa paglakad. Bihira at seryoso ang kondisyong ito, ngunit may malinaw na paraan ng paggamot.

Tungkol sa Kondisyong Ito

Kapag ang ihi ay tumatama sa pubic bone (buto sa ari), nagdudulot ito ng impeksiyon ng buto (**osteomyelitis**) at pagkasira ng kasukasuan. Mga karaniwang sintomas:

- **Matinding sakit sa ari, singit, o pelvis**, madalas na lumalalang sa paglakad
- Hirap lumakad o magtayo
- Paulit-ulit na impeksiyon sa ihi (UTI); minsan ay pagtagas ng ihi

Ang sakit ay madalas na ipalagay na arthritis o problema sa buto, kaya maaaring matagal bago matukoy ang tamang diagnosis.

Mga Sanhi

Halos palagi itong isang huling komplikasyon ng **paggamot sa prostate cancer** — lalo na ng **radiation**, kadalasang kasunod ng nakaraang operasyon sa bladder neck o urethra. Ang tissue na natamaan ng radiation ay mahirap gumaling, kaya nagagawa ng ihi na kumukulo sa buto.

MGA TERMINO

Pubic symphysis

Ang kasukasuan kung saan nagtatagpo ang mga pubic bone (buto sa ari) sa harapan ng pelvis.

Pubosymphyseal fistula

Koneksyon sa pagitan ng daanan ng ihi at ng kasukasuan/buto na iyon.

Osteomyelitis

Impeksiyon ng buto.

MRI

Ang pinakamabuting scan para makita ang buto at ang fistula.

Debridement

Surgical na pag-alis ng impektadong buto at tissue.

Urinary diversion

Pagpapalit ng daanan ng ihi palayo sa nasirang lugar; kadalasang pangmatagalang solusyon.

BAKIT AGGRESSIVE ANG PAGGAMOT DITO? Dahil ang problema ay **impektado at mahirap gumaling na tissue at buto** (madalas dahil sa radiation), ang simpleng pag-patch ay bihirang gumana. Ang pangmatagalang ginhawa ay kadalasang nangangailangan ng pag-alis ng impektadong buto at **pagpapalit ng daanan ng ihi palayo sa lugar** — kaya madalas irerekomenda ang urinary diversion. Ang kabutihan nito ay maaari nitong wakasan ang mga taon ng sakit.

Paano Ito Nasusuri

- **MRI** ng pelvis (pinakamabuti para sa buto) at pagtingin sa loob ng urethra/bladder
- Cultures para matukoy ang impeksiyon
- Maingat na kasaysayan — nakaraang paggamot sa prostate cancer, radiation, at mga operasyon

Paano Ito Ginagamot

- 1 **Antibiotics** para sa impeksiyon ng buto.
- 2 **Operasyon para alisin ang impektadong buto** (debridement) at linisin ang lugar.
- 3 **Palitan ang daanan ng ihi** — maraming pasyente ang kailangan ng **urinary diversion** (at minsan ay pag-alis ng nasirang bladder/urethra) dahil hindi gagaling ang tissue na natamaan ng radiation.
- 4 **Tissue flap** — malusog na kalamnan o omentum ang maaaring ilipat para punuin at pagalingin ang espasyo.

Ang pag-aalaga ay kadalasang **multidisciplinary** (urology kasama ang orthopedic at/o plastic surgery).

Mabuting Malaman

- Kung mayroon kang hindi maipaliwanag na sakit sa ari pagkatapos ng prostate radiation, banggitin ang kondisyong ito — madaling mapagkamalan.
- Maaaring nakakatakot ang urinary diversion, ngunit madalas itong ang dahilan ng pangwakas na **pagginghawa sa sakit** at impeksiyon.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Lagnat, pangiginig, o pakiramdam na lubhang may sakit** (posibleng kumakalat na impeksiyon)
- Lumalalang sakit sa ari/singit o **hindi makayanan ang paglakad**
- Hindi makaihi, o matinding pagdurugo

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang pubosymphyseal fistula ay nagpapahintulot sa ihi na kumukulo sa pubic bone (buto sa ari), nagdudulot ng matinding sakit at impeksiyon ng buto — kadalasang maraming taon pagkatapos ng prostate radiation.
2. Madalas itong ipalagay na arthritis; ang MRI ang nagpapatunay ng diagnosis. Sabihin sa inyong care team ang nakaraang radiation.
3. Inaalis ng paggamot ang impektadong buto at kadalasang pinapalitan ang daanan ng ihi (diversion) — aggressive, ngunit maaari itong wakasan ang sakit.