

Ang pyeloplasty ay operasyon para ayusin ang UPJ obstruction (baradong kidney) — ang pagkitid sa pagitan ng bato (kidney) at ng ureter, ang tubo na nagdadala ng ihi sa pantog. Inaalis ng operasyon ang baradong bahagi at ginagawang maluwag ang koneksyon. Ito ang pinakamatibay na solusyon, na may tagumpay na higit sa 90%.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Sa itaas ng ureter, kung saan nagtatagpo ito sa bulsa ng bato (ang **renal pelvis**), maaaring pumayat ang daanan ng ihi. Minsan may **ugat na dumudulog** dito. Ito ang tinatawag na **UPJ obstruction (baradong kidney)**. Sa pyeloplasty, ang inyong siruhano ay:

- Inaalis ang pinayat na bahagi
- Tinitahi ang malusog na ureter sa renal pelvis sa isang **maluwag, parang funnel na koneksyon**
- Naglalagay ng malambot na **stent (double-J)** sa loob para hawakan ito habang gumagaling

Kadalasan ito ay ginagawa nang **robotically o laparoscopically** sa pamamagitan ng ilang maliliit na butas; minsan sa isang bukas na hiwa.

Ligtas Ba Ito?

Ang pyeloplasty ay isang maaasahan at epektibong operasyon, na may pangmatagalang tagumpay na higit sa 90%. Tulad ng anumang operasyon, may kaunting panganib — pagdurugo, impeksiyon, o pansamantalang tagas ng ihi (karaniwang naaalagaan ng stent at drain). Bihirang bumalik ang pagkitid at kadalasang maaaring gamutin muli.

MGA TERMINO

Kidney (bato)

Ang organ na nagsasala ng dugo at gumagawa ng ihi.

Ureter

Ang tubo na nagdadala ng ihi mula sa bato papunta sa pantog.

UPJ

Ang ureteropelvic junction — kung saan nagtatagpo ang bato at ureter; ang baradong lugar.

Renal pelvis

Ang bulsa sa bato kung saan nangongolekta ang ihi bago pumasok sa ureter.

Ureteral stent (double-J)

Isang malambot na tubo sa loob na humahawak sa tahi habang gumagaling.

Crossing vessel

Ugat na maaaring dumudulog sa junction at nagdudulot ng bara.

Hydronephrosis

Pamamaga ng bato dahil sa ihing hindi makalabas.

Robotic / laparoscopic

Operasyong ginagawa sa pamamagitan ng maliliit na butas lamang.

MASAKIT BA? Ang operasyon ay sa ilalim ng general anesthesia, kaya wala kayong mararamdaman. Pagkatapos, asahan ang kaunting sakit sa maliliit na hiwa, minsan sa balikat mula sa hangin sa keyhole surgery. Ang stent (double-J) sa loob ay maaaring magdulot ng biglaang pangangailangang umihi o banayad na sakit sa tagiliran. Karamihan ay nanatili ng 1–2 gabi; tumatagal ng 2–3 oras.

Paano Maghanda (Bago ang Operasyon)

- Ginagawa sa ilalim ng **general anesthesia** — sundin ang lahat ng tagubilin (pag-aayuno, at kung aling gamot ang ihihint, kasama ang blood thinners).
- Ang **pagsusuri ng ihi** ay ginagawa para alamin kung may impeksiyon — kailangang gamutin muna ang anumang impeksiyon.
- Maghanda para sa isang **stent sa loob ng mga 4–6 linggo**, at ayusin ang sasakyan pauwi.

Sabihin sa inyong care team **nang maaga** kung kayo ay:

- Umiinom ng **blood thinner**, o may kasalukuyang impeksiyon sa ihi
- Nagkaroon na ng operasyon sa bato o tiyan noon

Ano ang Nangyayari sa Panahon ng Operasyon

- 1 Natutulog kayo sa ilalim ng anesthesia at binibigyan ng antibiotics.
- 2 Gumagawa ang siruhano ng ilang maliliit na butas (o isang bukas na hiwa) at inilalantad ang baradong junction.
- 3 Inaalis ang pinayat na bahagi at binabago ang hugis ng renal pelvis.
- 4 Tinitahi ang malusog na ureter sa pelvis nang maluwag, sa ibabaw ng stent; maaaring mag-iwan ng maliit na drain, at isinasara ang mga hiwa.

Pagkatapos ng Operasyon

- Kadalasang uuwi kayo sa loob ng **isa o dalawang araw**. Ang **stent ay mananatili ng mga 4–6 linggo**, pagkatapos ay aalisin sa mabilis na cystoscopy.
- Normal ang mga sintomas ng stent (biglaang pangangailangang umihi, sakit sa tagiliran, o pink na ihi).
- **Iwasan ang mabigat na pagbubuhay at pag-aabot** sa loob ng ilang linggo, at uminom ng maraming tubig.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panginginig
- Matinding o lumalalang sakit sa tagiliran o tiyan
- Matinding pagdurugo, o mga namuong dugo sa ihi
- Hindi makaihi, o patuloy na pagduwal o pagsusuka
- Lumalaking pamumula, sakit, o pagtagas sa hiwa

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Inaalis ng pyeloplasty ang bara sa daanan ng bato at ginagawang maluwag ang koneksyon — ang pinakamatibay na solusyon, kadalasang ginagawa sa maliliit na butas.
2. Para maghanda: pag-aayuno at gamot, gamutin muna ang impeksiyon, stent ng mga 4–6 linggo, at ayusin ang sasakyan.
3. Ang stent ay maaaring magdulot ng biglaang pangangailangang umihi o sakit sa tagiliran hanggang maalis ito sa klinika.