

Rectourethral Fistula (sa mga Lalaki)

Impormasyon para sa Pasyente · Abnormal na koneksyon sa pagitan ng tumbong (rectum) at urethra **WARWIKI**

Ang rectourethral fistula ay isang abnormal na koneksyon (maliit na tunnel) sa pagitan ng **tumbong** (rectum) at ng **urethra** (tubo ng ihi). Maaari nitong payagan ang ihi na pumasok sa tumbong at ang hangin o dumi na pumasok sa ihi, na nagdudulot ng paulit-ulit na impeksiyon. Nakaka-distress ito, ngunit maaayos — karaniwang sa pamamagitan ng maplanong staged repair.

Tungkol sa Kondisyong Ito

Kabilang sa mga sintomas ang **hangin o dumi sa ihi** (bula habang umihi, maulap o mabahong ihi), **pagtagas ng ihi mula sa tumbong**, paulit-ulit na impeksiyon sa ihi, at diskomfort sa pelvic area. Ito ay isang problema sa "tubo" na may solusyon sa "tubo" — hindi ito bunga ng anumang ginawa ninyo.

Mga Sanhi

Karamihan sa rectourethral fistula ay **komplikasyon ng paggamot sa prostate cancer** — operasyon (prostatectomy), **radiation**, o ablation (tulad ng cryotherapy o HIFU) — o mula sa operasyon sa tumbong. Minsan dulot ng injury, impeksiyon, o inflammatory bowel disease. Ang mga fistula pagkatapos ng **radiation** ay mas mahirap pagalingin.

MGA TERMINO

Fistula

Abnormal na tunnel na nag-uugnay ng dalawang organ.

Rectourethral

Sa pagitan ng tumbong (rectum) at urethra.

Pneumaturia

Hangin o bula sa ihi.

Fecaluria

Dumi sa ihi.

Diversion

Pansamantalang pag-reroute ng ihi at/o dumi para makapagpagaling.

Colostomy

Pansamantalang bukasang para sa dumi na maaaring baligtarin paglaon.

Gracilis flap

Kalamnan mula sa hita na kadalasang ginagamit para palakasin ang pag-aayos.

BAKIT KAILANGAN KO NG PANSAMANTALANG STOMA O CATHETER MUNA? Ang pag-divert ng ihi (catheter o tubo) at minsan ng dumi (pansamantalang colostomy) ay nagpapababa ng presyon sa lugar, nagkokontrol ng impeksiyon, at nagpapahintulot sa namumula na tisyu na gumaling — na nagbibigay sa susunod na operasyon ng pinakamataas na pagkakataon na magsanib. Ang mga diversion ay karaniwang **pansamantala** at binabaligtad pagkatapos gumaling.

Paano Ito Nasusuri

- Pagtingin sa loob ng pantog/urethra (**cystoscopy**) at ng tumbong
- **Mga dye test** at imaging para ma-mapa ang sukat at lokasyon ng fistula
- Pagsusuri ng kasaysayan (paggamot sa prostate, radiation) at kalidad ng tisyu

Paano Ito Ginagamot

- 1 **Pahintulutang gumaling at mag-divert** — catheter (at minsan pansamantalang colostomy) para kontrolin ang sintomas at payagang gumaling ang tisyu.
- 2 **Surgical repair** — karaniwang sa pamamagitan ng lugar sa pagitan ng bayag at puwit (transperineal), isinasara ang koneksyon sa mga layer.
- 3 **Tissue flap** — malusog na kalamnan (kadalasang **gracilis** flap mula sa hita) ay inilalagay sa pagitan ng mga repair, lalo na pagkatapos ng radiation.
- 4 **Pag-baligtad** — binabaligtad ang pansamantalang stoma paglaon, kapag nakumpirma na ang paggaling.

Mabuting Malaman

- Mahalaga ang tamang oras — madalas na hinihintay ng mga siruhano na mawala ang pamamaga bago mag-ayos.
- Ang maliliit na fistula na hindi na-radiate ay minsang nagsasara sa catheter lamang.
- Ang malusog na pagkain at hindi paninigarilyo ay nakakatulong sa paggaling.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Lagnat, pangangatal, o matinding pagkamasama** (posibleng malubhang impeksiyon)
- Matinding sakit sa pelvic area o tumbong
- **Hindi makaihi**, o matinding pagdurugo

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang rectourethral fistula ay nag-uugnay ng tumbong at urethra — nagdudulot ng hangin/dumi sa ihi at mga impeksiyon — kadalasang pagkatapos ng paggamot sa prostate cancer.
2. Ang pag-aalaga ay karaniwang staged: mag-divert at hayaang gumaling muna, pagkatapos ay mag-repair (kadalasang may tissue flap, lalo na pagkatapos ng radiation), pagkatapos ay baligtarin ang pansamantalang stoma.
3. Maaayos ito. Humingi agad ng tulong para sa lagnat, matinding sakit, o kawalan ng kakayahang umihi.