

Retrograde Urethrogram (RUG)

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Ano ang inaasahan bago ang X-ray ng urethra

Ang retrograde urethrogram — o “RUG” — ay isang maikling X-ray na kumukuha ng larawan ng inyong urethra, ang tubo na nagdadala ng ihi palabas ng katawan. Isang maliit na halaga ng contrast dye ay dahan-dahang inilalagay sa urethra upang malinaw itong makita sa X-ray. Tinutulungan nito ang inyong siruhano na mahanap at masukat ang anumang pagsikip ng urethra (stricture), peklat, o pinsala bago planuhin ang paggamot.

Tungkol sa Pagsusuring Ito

Ang peklat o pagsikip sa loob ng urethra — tinatawag na **stricture** — ay mahirap makita sa isang karaniwang scan. Pinupuno ng RUG ang tubo ng espesyal na contrast dye na lumalabas na puti sa X-ray. Lumilikha ito ng malinaw na “mapa” ng loob ng inyong urethra.

Maaaring mag-order ng RUG ang inyong siruhano upang:

- Hanapin ang pagsikip o peklat at masukat kung nasaan ito at gaano ito kahaba
- Suriin ang urethra pagkatapos ng pinsala
- Planuhin ang operasyon para ayusin ang urethra
- Tingnan kung paano gumagaling ang urethra pagkatapos ng pagkukumpuni

Ipinapakita ng pagsusuri ang bukas na daanan sa loob ng inyong urethra — ang landas ng ihi. Hindi nito tinitingnan ang mga bato (kidney), at hindi ito paggamot; isa itong larawan na gabay sa susunod na hakbang.

Ligtas Ba Ito?

Oo. Ang RUG ay isang karaniwang, mababang-panganib na pagsusuri. Maliit ang halaga ng X-ray na ginagamit, at ang contrast dye ay batay sa tubig at lumalabas sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Karamihan sa mga tao ay nakakaramdam lamang ng maikling, banayad na kakulangan sa ginhawa. Ang hindi karaniwang side effect — impeksiyon sa ihi (UTI), kaunting pagdurugo, o pansamantalang hirap sa pag-ihing — ay karaniwang banayad at lumalagpas nang mabilis.

MGA TERMINO

Urethra

Ang tubo na nagdadala ng ihi mula sa pantog palabas ng katawan.

Stricture

Isang makitid o may peklat na bahagi ng urethra na maaaring magpabagal o makaharang sa daloy ng ihi.

Contrast dye

Isang likido na lumalabas na puti sa X-ray upang makita ang loob ng urethra.

Catheter

Isang manipis, malambot na tubo. Sa pagsusuring ito, ang dulo lamang nito ang nakapasok sa bukana — hindi ito pumapasok nang buo.

Fluoroscopy

Isang uri ng X-ray na nagpapakita ng buhay, gumagalaw na larawan habang dumadaan ang dye.

Meatus

Ang bukana sa dulo ng ari (penis) kung saan lumalabas ang ihi.

Urine culture

Isang mabilis na pagsusuri sa sample ng ihi upang tingnan ang impeksiyon bago ang test.

Reconstructive urologist

Isang siruhano na espesyalista sa urinary tract at sa pagkukumpuni ng urethra.

MASAKIT BA? Karamihan sa mga tao ay nakakaramdam lamang ng maikling presyon o hapdi habang pumapasok ang dye, hindi matinding sakit. Maaaring huminto ang team anumang oras — sabihin lang sa kanila kung hindi kayo komportable. Tatagal ang pagsusuri nang humigit-kumulang 15–30 minuto.

Paano Maghanda (Bago ang Pagsusuri)

Kaunti lamang ang kailangang gawin para maghanda. Sa karamihang kaso:

- Maaari kayong **kumain at uminom nang normal** — hindi kailangang mag-fast maliban kung sabihin ng inyong team.
- Inumin ang inyong **karaniwang gamot** maliban kung hihilingin ng inyong team na ihinto ang isa.
- Karaniwang **maaari kayong magmaneho pauwi**, dahil hindi kailangan ng sedation para sa karamihang pasyente.

Sabihin sa inyong team nang maaga kung kayo ay:

- Nakadanas na ng reaksiyon sa X-ray contrast dye o iodine
- Umiinom ng blood thinner
- May mga palatandaan ng UTI (hapdi, lagnat, o maulap at mabahong ihi) — ang aktibong impeksiyon ay maaaring mangailangan ng muling pag-iskedyul ng pagsusuri

Maaaring hilingin sa inyo na magbigay ng **sample ng ihi** upang tingnan ang impeksiyon, at maaari kayong bigyan ng **antibiotic** bago o pagkatapos ng pagsusuri upang mabawasan ang maliit na panganib ng impeksiyon.

Ano ang Nangyayari Habang ang Pagsusuri

- 1 Humihiga kayo sa X-ray table, karaniwang bahagyang nakatagilid. Tinutulungan kayo ng team sa posisyon.
- 2 Nililinis ang dulo ng ari. Isang maliit, malambot na tubo ay inilalagay **sa dulo lamang ng bukana** — ang tuktok lamang. Maaaring dahan-dahang paloonin ang isang maliit na balloon upang mapanatili ito sa lugar.
- 3 Dahan-dahang inilalagay ang dye sa urethra habang kinukuha ang mga X-ray na larawan. Maaaring hilingin sa inyong huwag gumalaw at huminga nang normal.
- 4 Tinitingnan ng team ang dye sa screen at kumukuha ng ilang larawan mula sa iba't ibang anggulo. Pagkatapos, iniaalis ang tubo.

Pagkatapos ng Pagsusuri

- Karaniwang maaari kayong umuwi at bumalik sa **normal na gawain agad-agad**.
- Maaari kayong makaramdam ng **banayad na hapdi kapag nag-ihi** sa loob ng isang araw. Ang pag-inom ng dagdag na tubig ay tumutulong na ilabas ito at nagpapadali nito.
- Maaari kayong makakita ng **kaunting dugo** sa dulo, o magaan na kulay-rosas sa ihi. Ito ay karaniwan at karaniwang nawawala sa loob ng isang araw.

Tawagan ang opisina ng inyong siruhano o humingi ng tulong kung kayo ay may:

- Lagnat o panginginig
- Hirap sa pag-ihi, o hindi talaga kayo makaihi
- Matinding pagdurugo, o pagdurugo na hindi tumitigil
- Sakit na lumalala imbes na bumuti

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang RUG ay mabilis at ligtas na X-ray na nagmamapa ng loob ng urethra gamit ang contrast dye — para planuhin ng siruhano ang tamang paggamot.
2. Kaunti lamang ang kailangang gawin para maghanda. Kumain, uminom, at inumin ang inyong karaniwang gamot — ngunit sabihin sa inyong team ang tungkol sa anumang allergy sa dye, blood thinner, o palatandaan ng UTI.
3. Karamihan ay nakakaramdam lamang ng maikling presyon at umuwi agad. Ang banayad na hapdi o kaunting dugo sa loob ng isang araw ay normal — uminom ng dagdag na tubig.