

Simple Prostatectomy

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Operasyon para sa napakalaking prostate (BPH)

Ang simple prostatectomy ay operasyon para sa **napakalaking paglaki ng prostate (BPH)** na humaharang sa daloy ng ihi. Iniaalis ng siruhano ang makapal na panloob na bahagi ng prostate — ang bahaging nagdudulot ng harang — sa pamamagitan ng tiyan, bukas o robotic/keyhole na paraan. Epektibo ito para sa malalaking glandula.

Mahalagang Pagkakaiba

Ang “simple” prostatectomy ay **hindi** katulad ng “radical” prostatectomy para sa **kanser** sa prostate. Ang radical na operasyon ay nag-aalis ng buong prostate para gamutin ang kanser. Ang **simple** prostatectomy ay nag-aalis lamang ng panloob na lumaki (benign) na tisyu at iniwanan ang panlabas na balangkas — ginagamot nito ang **harang dahil sa hindi-kanser na paglaki**.

Kailan Ginagamit

- Para sa **napakalaking prostate** na hindi angkop sa pamantayang scope procedure (TURP)
- Lalo na kung may kasamang **bato sa pantog** o malalaking bulsa ng pantog na kailangang ayusin
- Ang mga scope-based na opsyon para sa malalaking glandula (**HoLEP, Aquablation**) ay mga alternatibo — ipapayo ng inyong siruhano kung alin ang angkop sa inyo

MGA TERMINO

Simple prostatectomy

Pag-alis ng panloob na lumaking prostate para sa BPH (hindi para sa kanser).

Adenoma

Ang benign na panloob na tisyu ng prostate na iniaalis.

Radical prostatectomy

Ibang operasyon na nag-aalis ng buong prostate para sa kanser.

Bukas vs. robotic

Sa pamamagitan ng isang hiwa, o sa maliliit na keyhole na hiwa.

Retrograde ejaculation

Tuyo na orgasm — karaniwang epekto pagkatapos.

Catheter

Tubo na nagpapalabas ng ihi mula sa pantog sa loob ng ilang araw pagkatapos.

MASAKIT BA? Ginagawa ito sa ilalim ng general anesthesia, kaya walang nararamdaman habang isinasagawa. Dahil ito ay operasyon sa tiyan, ang pagbawi ay **mas matagal kaysa sa scope procedure** — ilang araw sa ospital (mas maikli sa robotic surgery), catheter sa loob ng ilang araw, at ilang linggong limitadong aktibidad.

Paano Maghanda

- Ginagawa sa ilalim ng **general anesthesia** — sundin ang tagubilin sa pag-aayuno at gamot (itigil ang blood thinner ayon sa utos).
- **Pagsusuri ng ihi** upang matiyak na walang impeksiyon.
- Huwag manigarilyo; mag-ayos ng sasakyan at tulong sa bahay.

Ano ang Nangyayari & Pagkatapos

- 1 Natutulog kayo; ibinibigay ang antibiotics.
- 2 Sa pamamagitan ng bukas o robotic/keyhole na paraan, iniaalis ang makapal na panloob na prostate at iniwanan ang panlabas na balangkas.
- 3 Inilalagay ang catheter (at kung minsan drain); ilang araw sa ospital (mas maikli sa robotic).
- 4 Ang catheter ay karaniwang nananatili ng **ilang araw hanggang isang linggo**.

Asahan ang makulay na ihi sa simula; **iwasan ang mabigat na pagbubuhat at pag-unat** sa loob ng ilang linggo.

Ano ang Maaasahan Pagkatapos

- Malakas at matagalang pagbuti ng daloy ng ihi.
- Ang **retrograde ejaculation** (tuyo na orgasm) ay karaniwan; ang seryosong epekto sa erection o kontrol ng ihi ay bihira.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Hindi makaihi** pagkatapos matanggal ang catheter
- **Malakas na pagdurugo o clot**, o lagnat/panginginig
- Lumalalang sakit sa tiyan, o pamumula/drainage ng sugat
- Sakit sa dibdib, hrap huminga, o namamaga at masakit na binti (emergency)

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang simple prostatectomy ay nag-aalis ng makapal na panloob na prostate para sa napakalaking BPH — ito ay **hindi** ang operasyon para sa kanser (na nag-aalis ng buong prostate).
2. Napaka-epektibo para sa malalaking glandula; ang pagbawi ay mas matagal kaysa sa scope procedures (HoLEP/Aquablation ay mga scope na alternatibo).
3. Asahan ang tuyo na ejaculation at catheter sa loob ng ilang araw. Tumawag para sa kawalan ng kakayahang umihi, malakas na pagdurugo, o lagnat.