

Stress Urinary Incontinence — Lalaki

Impormasyon para sa Pasyente · Pagtagas ng ihi pagkatapos ng operasyon sa prostate — kapag may biglaang diin o aktibidad

WARWIKI

Ang stress urinary incontinence (SUI) sa mga lalaki ay ang pagtagas ng ihi kapag may biglaang diin sa pantog — tulad ng pag-ubo, pagtayo, pag-angat ng mabigat, o aktibidad. Sa mga lalaki, ito ay halos palaging sanhi ng panghihina ng kalamnan na nagkokontrol ng ihi (sphincter) pagkatapos ng **operasyon sa prostate** o radiation. Madalas itong gumagaling sa unang taon, at kung hindi, may napaka-epektibong mga paggamot.

Tungkol sa Kondisyong Ito

Pagkatapos alisin ang prostate, ang pangunahing **urinary sphincter** (ang balbula na nagtatago ng ihi) ang gumagawa ng trabaho, at maaaring humina ito. Ang resulta ay pagtagas kapag may diin — mula sa ilang patak na nangangailangan ng pad, hanggang sa mas mabigat na pagtagas. Ito ay naiiba sa **urge incontinence** (biglaang pangangailangang umihi), na naiibang ginagamot; ang ilang lalaki ay may dalawa.

Mga Sanhi

- **Radical prostatectomy** (pag-aalis ng prostate para sa cancer) — ang pinakakaraniwang sanhi
- Iba pang mga pamamaraan sa prostate o **radiation sa pelvis**
- Hindi madalas, mga kondisyon sa nerbyo o pantog

Ang pagtagas ay karaniwang **pinakamalala sa simula** at gumagaling sa loob ng ilang linggo hanggang buwan habang humuhusay ang pagbubukod at lakas ng pelvic floor.

MGA TERMINO

Stress incontinence

Pagtagas ng ihi kapag may diin — pag-ubo, pagtayo, pag-angat.

Sphincter

Ang kalamnan-balbula na nagtatago ng ihi hanggang sa piliin mong umihi.

Prostatectomy

Operasyon upang alisin ang prostate; ang karaniwang sanhi ng SUI sa lalaki.

Pelvic floor

Ang mga kalamnan na isinasanay upang makatulong na kontrolin ang ihi.

Pad test

Pagbibilang ng mga pad bawat araw upang sukatin kung gaano karaming ihi ang tumatagas.

Male sling

Isang suporta na inilalagay sa ilalim ng urethra para sa banayad hanggang katamtamang pagtagas.

ProACT balloons

Dalawang naaayos na lobo sa tabi ng urethra, inaayos sa opisina; isang minimally invasive na pagpipilian.

Artificial urinary sphincter

Isang nailalagay na device (AUS) — isang cuff na iyong kinokontrol — para sa katamtaman hanggang malubhang pagtagas.

GUMAGALING BA ITO NANG KUSA? Madalas, oo — ang pagtagas pagkatapos ng operasyon sa prostate ay karaniwang gumagaling sa unang 6–12 buwan, lalo na sa pelvic floor exercises. Kung ang abala-abala na pagtagas ay nagpapatuloy nang higit sa isang taon, iyon na ang panahon para isaalang-alang ang male sling, naaayos na mga lobo, o artificial sphincter — lahat ay gumagana nang napakahusay.

Paano Ito Nasusuri

- Usapan tungkol sa kung kailan at gaano karami kang tumatagas (madalas binibilang bilang **mga pad bawat araw**)
- Isang **pagsusuri ng ihi**, at pagsusuri kung gaano kahusay kang nakakaiwas
- Bago ang operasyon: pagtingin sa urethra (cystoscopy) at minsan pagsubok ng function ng pantog

Paano Ito Ginagamot (Hakbang-Hakbang)

- 1 **Pelvic floor exercises** (Kegel), pinakamabuting sinimulan sa panahon ng operasyon, kasabay ng pamamahala ng likido at timbang.
- 2 **Mapagmasid na pagbabago** sa unang taon, na gumagamit ng mga pad/proteksyon kung kinakailangan.
- 3 **Male sling** — para sa tuluy-tuloy na banayad hanggang katamtamang pagtagas (wala nang operasyong susunod).
- 4 **ProACT adjustable balloons** — isa pang minimally invasive na pagpipilian para sa banayad hanggang katamtamang pagtagas; dalawang maliit na lobo ang inaayos sa opisina sa ilang pagbisita (hindi ginagamit pagkatapos ng radiation).
- 5 **Artificial urinary sphincter (AUS)** — ang gold standard para sa katamtaman hanggang malubhang pagtagas, at ang pagpili pagkatapos ng radiation. Bawat isa ay may sariling handout.

Pamumuhay Dito

- Gawin ang pelvic floor exercises nang tuluy-tuloy — ito ang pundasyon.
- Gumamit ng mga pad o protektibong damit para sa kumpiyansa habang gumagaling.
- Bawasan ang likido tuwing gabi at caffeine kung ang pagtagas sa gabi ay isang problema.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Pangangati, lagnat, o **dugo sa ihi** (posibleng impeksiyon)
- Biglaang **hindi makapagihi**
- Pagtagas na lumalalim sa halip na gumagaling

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang SUI sa lalaki ay halos palaging mula sa humina na sphincter pagkatapos ng operasyon sa prostate o radiation — at karaniwang gumagaling sa unang taon.
2. Ang pelvic floor exercises ang pundasyon; para sa paulit-ulit na pagtagas, ang male sling o artificial urinary sphincter ay gumagana nang napakahusay.
3. Bigyan ng hanggang isang taon ang pagbubukod bago magpasya sa operasyon. Tumawag para sa lagnat, dugo sa ihi, o hindi makapagihi.