

Инфекции мочевыводящих путей (UTI)

WARWIKI

Информация для пациента · Что такое UTI, как её лечат и как предотвратить

Инфекция мочевыводящих путей (UTI) возникает, когда бактерии размножаются в мочевыводящих путях. Чаще всего это инфекция **мочевого пузыря**, сопровождающаяся жжением, позывами и учащённым мочеиспусканием. Реже инфекция достигает **почки** — это серьёзнее. Большинство UTI быстро проходят при правильно подобранном антибиотике, а повторных случаев можно избежать.

Об этом состоянии

Инфекция мочевого пузыря (**цистит**) обычно проявляется:

- **Жжением или резью** при мочеиспускании
- **Позывами и учащённым мочеиспусканием** — частые походы в туалет небольшими порциями
- Мутной, тёмной или неприятно пахнущей мочой; дискомфортом внизу живота

Инфекция почки (пиелонефрит) серьёзнее и добавляет **повышение температуры, озноб, боль в спине или боку, тошноту** — при этих симптомах нужна срочная помощь.

Причины

Бактерии (обычно из кишечника) проникают через уретру и размножаются в мочевом пузыре. Риск повышают **половые контакты, менопауза** (снижение эстрогена), неполное опорожнение мочевого пузыря, катетеры, камни и сахарный диабет.

ТЕРМИНЫ

UTI

Инфекция любого отдела мочевыводящих путей.

Цистит

Инфекция мочевого пузыря — самая частая UTI.

Пиелонефрит

Инфекция почки — серьёзнее, нередко с температурой.

Посев мочи

Анализ, позволяющий вырастить бактерии и выбрать нужный антибиотик.

Рецидивирующая UTI

Повторные инфекции (обычно 2–3 и более в год).

Вагинальный эстроген

Крем/таблетка в низкой дозе, снижающая риск UTI после менопаузы.

Бессимптомная бактериурия

Бактерии в моче без симптомов — как правило, не требует лечения.

ВСЕГДА ЛИ НУЖНЫ АНТИБИОТИКИ? При наличии симптомов UTI лечат антибиотиками. Но если анализ мочи выявил бактерии, а вы **чувствуете себя хорошо**, лечение обычно **не** назначают — антибиотики в таком случае принесут больше вреда. Исключения: беременность и подготовка к некоторым урологическим процедурам.

Диагностика и лечение

- Диагноз подтверждают по **симптомам** и результатам **анализа/посева мочи**.
- Инфекция мочевого пузыря лечится **коротким курсом антибиотика**.
- При **инфекции почки** может понадобиться более сильный или длительный антибиотик, а иногда — госпитализация.
- Пройдите полный курс, даже если стало лучше.

Профилактика повторных UTI

- **Пейте достаточно воды** и не задерживайте мочеиспускание.
- Мочитесь после полового акта; подмывайтесь спереди назад.
- После менопаузы **вагинальный эстроген** снижает риск.
- Узнайте у врача о немедикаментозных методах; профилактические антибиотики — только при частых рецидивах.

Полезно знать

- Клюква и D-mannose помогают некоторым пациентам; доказательства неоднозначны — попробовать разумно.
- При частых UTI иногда проводят дополнительное обследование (неполное опорожнение, камни).
- При наличии катетера небольшое количество бактерий в моче допустимо — лечение назначают по симптомам, а не только по анализу.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Температура, озноб или боль в спине/боку** (возможная инфекция почки)
- Тошнота или рвота, общее тяжёлое состояние
- Видимая **кровь в моче** или симптомы не улучшаются на антибиотиках
- Любые симптомы UTI при беременности

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Большинство UTI — инфекции мочевого пузыря (жжение, позывы) и проходят за короткий курс антибиотика; инфекция почки (температура, боль в боку) серьезнее.
2. Бактерии в моче **без симптомов** обычно не требуют лечения — кроме беременности или подготовки к процедурам.
3. Предотвращайте рецидивы: пейте воду, мочитесь после секса, после менопаузы применяйте вагинальный эстроген. При температуре, боли в боку или рвоте обращайтесь к врачу.