

Уродинамика

Информация для пациента · Исследование наполнения и опорожнения мочевого пузыря

WARWIKI

Уродинамическое исследование (УДИ) — это группа тестов, которые измеряют, насколько хорошо мочевой пузырь накапливает и выводит мочу. Тонкие мягкие трубочки (катетеры) фиксируют давление при медленном наполнении и последующем опорожнении пузыря. Цель — воспроизвести ваши симптомы, чтобы врач точно установил причину и подобрал лечение.

Об этом исследовании

УДИ — не один тест, а несколько, которые проводят вместе. В зависимости от показаний они могут включать:

- **Урофлоуметрию** — вы мочитесь в специальный унитаз, измеряющий струю; затем проверяют объём остаточной мочи.
- **Цистометрию** — мочевой пузырь медленно наполняется, давление фиксируется, а вы сообщаете об ощущениях.
- **Исследование давление–поток** — давление измеряется в процессе мочеиспускания.
- Иногда одновременно делают **рентгеновские снимки** (видеоуродинамика).

Используются два тонких катетера: один вводится в мочевой пузырь через уретру, второй — небольшой — в прямую кишку (или влагалище) для измерения внутрибрюшного давления, чтобы отделить давление пузыря от напряжения мышц.

Это безопасно?

Да. УДИ — малорисковое интерактивное исследование. Основной риск — кратковременное жжение от катетеров и небольшая вероятность инфекции мочевыводящих путей (UTI). При необходимости назначают антибиотик. Никакой операции и времени на восстановление не требуется.

ТЕРМИНЫ

Уродинамика (УДИ)

Группа тестов, оценивающих накопление и выведение мочи.

Мочевой пузырь

Мышечный орган, накапливающий мочу до мочеиспускания.

Катетер

Тонкая мягкая трубочка для наполнения пузыря и измерения давления.

Цистометрия

Измерение давления и ощущений при постепенном наполнении пузыря.

Исследование давление–поток

Измерение давления во время мочеиспускания.

Урофлоуметрия

Оценка скорости и характера струи мочи.

Видеоуродинамика

То же исследование с одновременной рентгеноскопией.

Остаточная моча

Объём мочи, остающейся в пузыре после мочеиспускания.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Большинство пациентов ощущают давление и лёгкую неловкость от катетеров, но не боль. В ходе исследования вас попросят покашлять, изменить позу и помочиться — команда следит за вашим комфортом и работает в вашем темпе. Обычно процедура занимает около 30–60 минут, после чего можно сразу уйти домой.

Как подготовиться

- Возможно, вас попросят прийти с **умеренно наполненным мочевым пузырём** — следуйте полученным инструкциям.
- Принимайте **обычные лекарства**, но заранее уточните, нужно ли **отменить препараты для мочевого пузыря**: они могут влиять на результаты.
- Седация не требуется, поэтому вы, как правило, можете **приехать и уехать самостоятельно**.

Сообщите врачу **заранее**, если у вас:

- Признаки **инфекции мочевыводящих путей** (жжение, повышение температуры, мутная или резко пахнущая моча) — исследование может быть перенесено
- Приём антикоагулянтов или аллергия (в том числе на латекс)

Перед исследованием вас могут попросить сдать **анализ мочи** для исключения инфекции.

Что происходит во время исследования

- 1 Вы мочитесь в специальный унитаз, оценивающий струю; затем измеряется остаточный объём.
- 2 Врач аккуратно вводит катетеры — один в мочевой пузырь, маленький — в прямую кишку или влагалище.
- 3 Пузырь медленно наполняется; вы сообщаете, когда почувствуете первое ощущение наполнения и сильный позыв; вас могут попросить покашлять или сменить положение.
- 4 Вы мочитесь, пока регистрируется давление, после чего катетеры извлекаются.

После исследования

- Вы можете **сразу вернуться к обычной жизни**.
- Возможно **лёгкое жжение при мочеиспускании** в течение суток. Обильное питьё воды помогает.
- Моча может быть **слегка розовой** непродолжительное время — это нормально и проходит за день.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб
- Затруднённое мочеиспускание или полная его задержка
- Обильное кровотечение или сгустки крови в моче
- Нарастающая боль

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. УДИ показывает, как мочевой пузырь наполняется и опорожняется, — это помогает врачу выявить причину недержания, urgency или задержки мочи и назначить правильное лечение.
2. Подготовка минимальна: уточните, нужно ли отменить препараты для пузыря, придите с умеренно наполненным пузырём (если так велено) и сообщите о признаках инфекции.
3. Ожидайте давление, а не боль; сразу уходите домой. Лёгкое жжение или розовая моча в течение суток — норма. Пейте больше воды и звоните врачу при повышении температуры, обильном кровотечении или задержке мочи.