

Влагалищная гистерэктомия (при пролапсе)

WARWIKI

Информация для пациента · Удаление матки через влагалище с фиксацией свода

Когда матка опустилась в результате пролапса тазовых органов, одним из вариантов является **влагалищная гистерэктомия** — удаление матки через влагалище **без разреза на животе**. Операция почти всегда дополняется **подвешиванием** свода влагалища (и нередко другими вмешательствами) для надёжной поддержки тканей.

Об этой операции

Матку отсекают и извлекают через влагалище. Затем **свод влагалища фиксируют** к вашим собственным крепким тазовым связкам, чтобы предотвратить повторный пролапс. При необходимости добавляют пластику передней или задней стенки влагалища. Влагалищный доступ, как правило, означает **меньшую боль и более быстрое восстановление**, чем операция через живот.

Важно знать

- Удаление матки прекращает менструации и возможность вынашивания беременности.
- Если пролапс затрагивает преимущественно матку и вы хотите **её сохранить**, возможна операция без удаления (hysteropexy) — уточните у хирурга.
- При необходимости одновременно может быть выполнена операция по поводу **недержания мочи**.

ТЕРМИНЫ

Гистерэктомия

Операция по удалению матки.

Влагалищный доступ

Выполняется через влагалище, без разреза на животе.

Фиксация свода

Подвешивание верхушки влагалища к связкам для поддержки.

Hysteropexy

Альтернатива с сохранением матки: подвешивание без удаления.

Пролапс

Опущение тазовых органов с ощущением давления или выпячивания.

Влагалищный тампон

Марлевый тампон, временно устанавливаемый после операции для поддержки заживления.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под анестезией — во время неё вы ничего не чувствуете. Поскольку разреза на животе нет, восстановление обычно легче, чем после других видов гистерэктомии: ожидайте умеренную болезненность; большинство пациентов выписываются в тот же день или после одной ночи в стационаре.

Как подготовиться

- Соблюдайте **инструкции по анестезии** (голодание, отмена разжижающих кровь препаратов по назначению).
- Пройдите предоперационное обследование; уточните, планируется ли пластика или лечение недержания мочи.
- Не курите; организуйте сопровождение домой и помощь после операции.

Что происходит

- 1 Вам вводят анестезию; назначают антибиотики.
- 2 Матку отсекают и удаляют **через влагалище**.
- 3 Свод влагалища **фиксируют** к связкам; при необходимости выполняют дополнительные пластики.
- 4 На короткое время устанавливают катетер и иногда влагалищный тампон.

После операции

- Лёгкие выделения и мажущие кровянистые выделения в течение нескольких недель — норма по мере заживления свода влагалища.
- **Избегайте подъёма тяжестей, натуживания и половой жизни около 6 недель.**
- Следите за мягким стулом, чтобы не тужиться; отдыхайте, затем постепенно увеличивайте активность.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры, озноб или обильное кровотечение
- **Невозможность помочиться** или нарастающая боль в тазу/животе
- Выделения с неприятным запахом или ощущение чего-либо выпадающего из влагалища

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Влагалищная гистерэктомия удаляет матку через влагалище (без разреза на животе) и включает фиксацию свода влагалища.
2. После операции прекращаются менструации и невозможна беременность; если хотите сохранить матку — спросите об операции hysteropexy.
3. Избегайте нагрузок и половой жизни ~6 недель; мажущие выделения — норма. Звоните при температуре, сильном кровотечении или затруднённом мочеиспускании.