

壓力性尿失禁 (SUI) — 女性

病人須知 • 咳嗽、大笑、搬嘢或運動時漏尿

WARWIKI

壓力性尿失禁 (SUI) 係指當腹部突然受壓時——例如咳嗽、打噴嚏、大笑、搬重物或運動——會漏少少尿。女性通常係因為生育後或更年期後尿道下方嘅支撐組織變弱而出現呢個問題。SUI 好常見，亦好容易治療，由簡單嘅運動到快捷有效嘅手術，都有方法可以幫到你。

關於呢個病

尿道（排尿嘅管道）正常喺你咳嗽或用力時會保持閉合，靠嘅係盆底肌肉同周圍組織嘅支撐。當呢啲支撐變弱，腹壓突然升高就會將尿擠出嚟。SUI 嘅特徵係**活動時漏尿**——唔係因為突然好想尿（嗰個係膀胱過度活躍症；兩者同時有嘅話叫做**混合性尿失禁**）。

成因

- **懷孕同分娩**（最主要嘅原因）
- **更年期**同衰老
- 長期咳嗽、便秘或搬重物
- 體重過重、或曾做盆腔手術

詞彙解釋

壓力性尿失禁

因腹部受壓——咳嗽、搬嘢、運動——而漏尿。

尿道

將尿液排出體外嘅管道。

盆底

支撐膀胱同尿道嘅肌肉群。

凱格爾運動

鍛煉盆底肌肉嘅收縮運動。

混合性尿失禁

同時有壓力性漏尿同急迫性漏尿。

子宮托 (pessary)

放入陰道嘅小型支撐裝置，幫助減少漏尿。

尿道填充注射

診所內注射，幫助尿道更好地密封。

中段尿道吊帶

手術中放置喺尿道下方嘅細小網帶支撐。

我需要做手術嗎？ 唔一定。好多女性靠盆底運動同生活習慣改變已有改善，亦有人選擇使用支撐裝置。手術（例如吊帶手術）非常有效，如果你想要持久嘅解決方案可以考慮——但係話做唔做係你嘅選擇，可以先由簡單嘅方法開始。

點樣診斷

- 詢問你喺咩情況下漏尿，並做體格檢查（有時會做咳嗽測試）
- **尿液化驗**排除感染，並檢查膀胱排空情況
- 手術前有時需要做尿動力學檢查

點樣治療（循序漸進）

- 1 **盆底運動（凱格爾運動）**及物理治療、減重、治療咳嗽或便秘。
- 2 **支撐裝置**——陰道子宮托 (pessary) 或成藥插入裝置。
- 3 **尿道填充注射**——診所內快速注射，幫助尿道更好地密封。
- 4 **手術**——**中段尿道吊帶手術**（或自體筋膜吊帶手術），效果持久。每個選項都有獨立嘅病人資料。

日常照顧

- **學習嘅咳嗽、打噴嚏或搬嘢之前先收緊盆底**（「預防收縮法」）。
- 每日做盆底運動——通常需要 6-12 星期先見效。
- 治療便秘同慢性咳嗽，減少腹壓。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 灼熱感、尿急或**小便有血**（可能係感染）
- 同時有**強烈尿急時漏尿**——治療方式可能唔同
- 感覺膀胱排唔清

要記住嘅三件事

1. 女性 SUI 係因為尿道下方支撐減弱，喺腹部受壓時漏尿——好常見，亦好容易治療。
2. 治療方法由盆底運動、支撐裝置，到注射治療，再到吊帶手術，一步一步升級。
3. 運動需要數星期先見效；咳嗽前記得收緊盆底。手術係選擇，唔係必須。