

睪固酮替代療法（男性）

WARWIKI

病人須知 · 適用於確診低睪固酮並有症狀嘅患者

睪固酮替代療法 (TRT) 係用嚟治療同時有確診低睪固酮同相關症狀嘅男性 — 例如性慾減退、疲勞、情緒低落、肌肉減少或勃起功能障礙 (ED)。療法透過凝膠、注射、貼片或植入顆粒，將睪固酮恢復至正常水平。TRT 唔係「抗衰老」療法，亦唔適用於睪固酮正常嘅人。

點樣運作 & 適合邊啲人

低睪固酮（性腺功能減退症）需要兩次早上空腹抽血加上症狀才可確診 — 單靠一個低數值係唔夠嘅。當兩者都符合，補充睪固酮可以喺數週至數個月內改善精力、性慾、情緒同肌肉量。

用藥形式

- **凝膠或溶液** — 每日塗抹（須避免皮膚接觸女性或兒童）。
- **注射** — 每 1-2 週一次，或長效劑型約每 10 週一次。
- **貼片、植入顆粒**（每 3-6 個月）或鼻用凝膠。

詞彙解釋

睪固酮

男性主要荷爾蒙；影響性慾、精力、情緒同肌肉。

性腺功能減退症

確診低睪固酮。

血細胞比容

TRT 可能令呢個血液指數升高，需要監測。

前列腺特異抗原 (PSA)

治療前後都要檢查嘅前列腺血液指標。

生育能力

TRT 會降低精子產生量 — 如果你想要孩子，要預早告知醫療團隊。

凝膠轉移

凝膠蹭到其他人身上 — 要蓋住塗抹位置並洗手。

有計劃生育？ 請先告知醫療團隊。TRT 會降低精子產生量，可能導致不育 — 有時影響持久。如果生育對你重要，有其他療法可以提升睪固酮同時保護精子。未討論前唔好開始 TRT。

監測（重要）

TRT 需要定期覆診同抽血：

- **睪固酮水平** — 確認數值喺正常範圍內。
- **血細胞比容** — TRT 可能令血液變濃；如果數值過高，醫生會調整或暫停劑量。
- **PSA / 前列腺** — 治療前後均需檢查；未受控制嘅前列腺癌患者唔可以開始 TRT。

安全使用

- **凝膠**：按指示塗抹，待乾後蓋住，洗手 — 避免接觸女性及兒童。
- 唔好自行更改劑量；準時接受所有驗血。
- 如有心臟病或**睡眠窒息症**，要告知醫療團隊（TRT 可能令情況惡化）。

常見副作用

- 暗瘡、皮膚出油、水腫
- 乳房觸痛；睪丸縮小；生育能力下降
- 紅血球增多（可能需要監測或放血）

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 胸痛、腳腫／腳痛或呼吸困難
- 嚴重頭痛、視力改變或血液過濃症狀
- 新出現嘅排尿問題或前列腺症狀

要記住嘅三件事

1. TRT 適用於**確診低睪固酮加上有症狀嘅男性** — 唔係正常水平或抗衰老用途。
2. TRT 會影響生育能力 — 如果你可能想要孩子，開始前要告知醫療團隊。
3. 需要持續監測（睪固酮、血細胞比容、前列腺）。使用凝膠時避免接觸他人。