

TURP — 經尿道前列腺切除術

病人須知 · 治療前列腺增大嘅標準手術

WARWIKI

TURP 係治療良性前列腺增生 (BPH) 引致尿流阻塞嘅常見而有效手術。醫生會將內窺鏡由尿道伸入，唔需要在體外開刀，用電力切除壓住尿道嘅前列腺內層組織，令尿流明顯改善。呢個手術已有數十年臨床記錄。

關於呢個程序

醫生會將一支細細嘅儀器（**切除鏡**）由尿道伸入，用電力切除圈逐塊切走阻塞嘅前列腺內層組織，令尿道變寬。前列腺外層會保留。手術後會放置尿管幫助癒合。

安唔安全？

TURP 係研究得最多嘅泌尿外科手術之一，療效顯著。如同所有手術，都有風險 — 出血、感染、暫時刺激感 — 以及一些預期嘅持久性影響（見下方）。呢個手術最適合**中等大小**嘅前列腺；前列腺太大嘅病人或者更適合 HoLEP、Aquablation 或簡單前列腺切除術。

詞彙解釋

TURP

經尿道前列腺切除術 — 用內窺鏡治療 BPH 嘅手術。

BPH

良性（非癌症）前列腺增生。

切除鏡

用嚟切除前列腺嘅內窺鏡及電力切除圈儀器。

逆行射精

精液倒流入膀胱 — 常見但無害嘅術後情況。

尿管

術後放置 1–3 日幫助引流膀胱嘅喉管。

膀胱沖洗

術後初期經尿管輕力沖洗膀胱，清除血液。

術後會有咩變化？ 大多數男性嘅尿流會明顯增強。最常見嘅持久性變化係**逆行射精** — 精液倒流入膀胱，性高潮感覺正常但射出嘅液體極少或全無。呢個情況無害（但會影響生育力）。勃起功能或控尿能力受到嚴重影響嘅情況並不常見。

點樣準備

- 手術需要**脊椎或全身麻醉** — 遵從禁食及藥物指示（按指示停服薄血藥）。
- 術前需要驗尿排除感染。
- 安排人接送；準備好術後放尿管幾日。

會發生咩事 & 之後

- 1 你會進入麻醉狀態；術前會注射抗生素。
- 2 醫生經內窺鏡切除阻塞嘅前列腺組織。
- 3 放置尿管，首日或會進行輕力膀胱沖洗。
- 4 通常住院一晚；**1-3 日**後拔除尿管。

術後數星期內，你可能會有**帶血小便**及輕微灼痛或尿急感；請多飲水，避免用力及搬重物。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 拔除尿管後**無法排尿**
- **大量出血或有血塊**阻塞尿流
- 發燒或畏寒
- 出血愈來愈多（術後 1-2 星期有少量出血屬正常 — 多休息多飲水）

要記住嘅三件事

1. TURP 經內窺鏡切除阻塞嘅前列腺內層（毋須開刀）— 係治療中等度 BPH 長久有效嘅標準手術。
2. 術後尿流會明顯改善；最常見嘅持久變化係逆行射精（無害）。
3. 帶血小便及刺激感會於數星期內消退。如無法排尿、大量出血或發燒請即求醫。