

尿道填充注射

病人須知 · 診所注射治療壓力性尿失禁

WARWIKI

尿道填充注射係一種微創療法，用嚟治療壓力性尿失禁 (SUI) — 即係咳嗽、笑或活動時漏尿。醫生會將柔軟物料注射喺尿道周圍，令尿道封閉得更好，咁喺腹壓上升時就唔咁容易漏尿。手術過程快、唔需要開刀，可作為吊帶手術嘅替代或前期選擇。

點樣運作

填充物料會注射入尿道壁幾個位置，**令尿道壁膨脹**，使管道閉合得更完全。尿道封閉改善後，腹壓突然升高時就較少會逼出尿液。

適合我嗎？

- 如果你想要一個**快捷、低風險**嘅非手術治療，呢個係好選擇
- 唔適合或唔想做吊帶手術嘅人士可考慮
- 可作為決定做手術前嘅**過渡**方案

效果一般**比吊帶手術短**，未必能完全根治漏尿，但可以**重複注射**。

詞彙解釋

壓力性尿失禁

腹壓增加時漏尿，例如咳嗽、笑、搬重物或運動。

填充劑

注射入尿道壁令其膨脹嘅柔軟物料。

尿道

將尿液排出體外嘅管道。

膀胱鏡

引導注射用嘅幼型攝影鏡頭。

吊帶 (sling)

放喺尿道下方嘅手術支撐物，效果較持久。

會唔會痛？ 通常係診所進行加局部麻醉，大約 10–15 分鐘。大多數人只係感覺輕微壓力，當日可以返屋企，快速恢復正常活動。之後短暫燒灼感係常見嘅。

點樣準備

- 事前做**尿液測試**排除感染
- 告知醫療團隊你有冇服用**薄血藥**及任何過敏情況
- 唔需要特別準備—通常可以自己駕車返屋企

會發生咩事

- 1 塗上麻醉藥。
- 2 插入幼細**膀胱鏡**觀察尿道。
- 3 喺尿道周圍幾個位置注射填充物料。
- 4 取出鏡頭；離開前要先排尿。

之後

- 輕微燒灼感、尿急或小便有少量血絲，持續一兩日係正常嘅。
- 之後可能短暫**排尿困難**—通常很快改善。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 手術後**完全排唔到尿**
- 發燒或畏寒（可能係感染）
- 大量出血或痛楚加劇

須知事項

- 幾個星期內可見完整效果。
- 如果漏尿隨時間復發，可以**重複注射**。
- 日後如想要更持久效果，仍可選擇吊帶手術。

要記住嘅三件事

1. 尿道填充注射係快捷、唔需要開刀嘅注射，幫助尿道密封，減少壓力性漏尿。
2. 效果比吊帶手術短，未必完全根治漏尿，但風險低、可重複進行。
3. 康復快。如果排唔到尿或之後發燒，請聯絡醫療團隊。