

尿道憩室係喺尿道（負責將尿液排出體外嘅管道）旁邊形成嘅一個小囊袋或小腔，幾乎只係發生喺女性身上。少量尿液會積聚喺入面，引起尿滴瀝、不適、感染或行房時痛。呢個情況好多時被忽略多年，但一旦確診，係可以有效治療嘅。

關於呢個病

最典型嘅三個症狀係“3D”：

- **尿後滴瀝 (Dribbling)** — 小便完之後仍有少量尿液滲漏
- **排尿灼熱感 (Dysuria)** — 小便時有灼熱或不適
- **行房痛 (Dyspareunia)** — 性交時疼痛

其他症狀包括**反覆尿道感染**、尿急或尿頻，或者係陰道前壁摸到一個有壓痛嘅腫塊，按壓時可能會有液體流出。

成因

一般認為係因為尿道周圍嘅小腺體**受阻塞後感染**，繼而破入尿道，留低一個充滿尿液嘅囊袋。呢個情況唔係癌症，亦唔係你做錯咩嘢引起嘅。

詞彙解釋

尿道

將尿液從體內排出嘅管道。

憩室

從中空管道向外突出嘅囊袋。

“3D”

尿後滴瀝、排尿灼熱感同行房痛。

磁力共振 (MRI)

術前用嚟清楚顯示憩室形狀嘅最佳掃描。

憩室切除術

切除囊袋並修復尿道嘅手術。

Martius 瓣

修復時有時用嚟加固縫合部位嘅小組組織瓣。

膀胱鏡檢查

用幼細鏡頭由內部觀察尿道同膀胱。

我需要做手術嗎？ 唔一定。細小且無症狀嘅憩室可以定期觀察。但如果引起尿滴瀝、感染、疼痛或令你困擾嘅腫塊，切除憩室（憩室切除術）係根治方法。你嘅外科醫生會先用 MRI 仔細評估。

點樣診斷

- 體格檢查 — 陰道前壁有壓痛腫塊，按壓時可能有液體流出
- **MRI** — 最能清楚顯示憩室嘅大小同形狀
- 有時需要做**膀胱鏡檢查**以由內部睇清楚開口位置

點樣治療

- 1 **觀察等待**：細小、無症狀嘅憩室可先觀察。
- 2 **先處理感染**：如有感染，先完成療程。
- 3 **憩室切除術** — 經陰道手術切除囊袋，並分層仔細修復尿道，有時會加用小組織瓣。
- 4 術後留置**尿管**待癒合，通常要做**癒合 X 光檢查**確認後先拔管。

注意事項

- 修復手術精細 — 術後預計要帶尿管數週。
- 大部分人術後症狀改善顯著；偶爾憩室可能復發或出現新嘅漏尿，屆時可再處理。
- 手術通常係感染已清除後才安排。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒、怕冷或盆腔疼痛加劇
- **唔能夠排尿**，或術後尿管停止引流
- 大量出血，或新出現持續性漏尿

要記住嘅三件事

1. 尿道憩室係尿道旁嘅小囊袋 — 記住“3D”（尿滴瀝、灼熱感、行房痛）同反覆感染。
2. MRI 係最佳診斷方法。無症狀嘅細小憩室可觀察；有困擾嘅就需要手術切除。
3. 術後預期需要尿管及癒合 X 光。出現發燒、唔能排尿或新嘅持續漏尿，請即刻聯絡醫療團隊。