

尿道感染 (UTIs)

WARWIKI

病人須知 · 了解尿道感染嘅成因、治療同預防方法

尿道感染 (UTI) 係細菌喺泌尿系統生長所引起嘅感染。大多數係膀胱感染，會引起灼熱感、尿急同尿頻。較少情況下感染會蔓延至腎臟，情況較為嚴重。大多數 UTI 用合適嘅抗生素可以快速清除，而且有好方法可以預防復發。

關於呢個病

膀胱感染（膀胱炎）通常會引起：

- 小便時有**灼熱或刺痛感**
- **尿急同尿頻** — 頻繁去廁所，但每次只有少量尿
- 尿液混濁、顏色深或有異味；下腹不適

腎臟感染（腎盂腎炎）較為嚴重，會額外出現**發燒、畏寒、背部或側腰痛，以及噁心** — 需要盡快求醫。

成因

細菌（通常來自腸道）經尿道進入並喺膀胱生長。增加感染風險嘅因素包括：**性行為、更年期**（雌激素降低）、排尿不完全、尿管、腎石同糖尿病。

詞彙解釋

UTI

泌尿系統任何部位嘅感染。

膀胱炎

膀胱感染 — 最常見嘅 UTI。

腎盂腎炎

腎臟感染 — 較嚴重，通常伴有發燒。

尿液培養

培養細菌以選擇合適抗生素嘅檢查。

復發性 UTI

反覆感染（通常係一年內 2-3 次或以上）。

陰道雌激素

低劑量乳霜／藥片，可降低更年期後 UTI 風險。

無症狀菌尿

尿液中有細菌但無症狀 — 通常唔需要治療。

一定要食抗生素嗎？ 如果你有症狀，UTI 係需要用抗生素治療嘅。但如果尿液檢查發現有細菌而你**完全冇感覺**，通常係**唔需要**治療 — 喺呢個情況下抗生素反而弊多於利。重要例外係懷孕期間，以及某些泌尿系統手術之前。

點樣診斷同治療

- 醫療團隊會根據你嘅**症狀**加上**尿液檢查／培養**來確診 UTI。
- 膀胱感染用**短療程抗生素**治療。
- **腎臟感染**可能需要較強或較長療程嘅抗生素，有時需要住院。
- 即使感覺好返，都要完成整個療程。

預防復發

- **多飲水**，唔好長時間憋尿。
- 性行為後排尿；如廁後由前向後抹。
- 更年期後，**陰道雌激素**可以降低感染風險。
- 可以問醫生有冇非抗生素選擇；只喺感染頻繁時才考慮預防性抗生素。

實用資訊

- 蔓越莓產品同 D-甘露糖對部分人有幫助，但證據參差 — 可以嘗試。
- 反覆 UTI 有時需要檢查有冇潛在原因（如排尿不完全、腎石）。
- 如果你有尿管，出現少量細菌係正常 — 治療係根據症狀決定，唔係單靠檢查結果。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- **發燒、畏寒或背部／側腰痛**（可能係腎臟感染）
- 噁心或嘔吐，或整體感覺非常不適
- 小便有明顯**血跡**，或食抗生素後症狀未有改善
- 你正在懷孕並出現任何 UTI 症狀

要記住嘅三件事

1. 大多數 UTI 係膀胱感染（灼熱、尿急），短療程抗生素即可治癒；腎臟感染（發燒、側腰痛）則較嚴重。
2. 尿液有細菌但有症狀通常唔需要治療 — 懷孕或某些手術前除外。
3. 多飲水、性行為後排尿、更年期後使用陰道雌激素可預防復發。如有發燒、側腰痛或嘔吐，請即求醫。