

陰道雌激素治療

WARWIKI

病人須知 · 低劑量局部治療，改善陰道乾澀及膀胱症狀

陰道雌激素係一種低劑量、直接放入陰道使用嘅雌激素 — 形式有乳霜、藥片或藥環 — 用嚟治療更年期後雌激素下降所引起嘅乾澀、刺激、性交疼痛同泌尿症狀。由於係局部發揮作用，極少量會進入血液，大多數人用起嚟都係安全嘅。

適用於咩情況

更年期後，雌激素降低會令陰道同尿道黏膜變薄變乾 — 呢個情況叫做**更年期泌尿生殖綜合症 (GSM)**。陰道雌激素可以恢復黏膜，並且：

- 紓緩乾澀、灼熱、痕癢同性交疼痛
- 減少尿急同尿頻
- 降低**反覆尿道感染 (UTI)** 嘅風險

安唔安全？

對大多數人嚟講係安全嘅。陰道雌激素係**極低劑量、局部使用** — 同治療潮熱嘅雌激素藥片或貼片唔一樣 — 進入身體嘅份量非常少。就算你有乳癌或其他荷爾蒙敏感性腫瘤嘅病史，通常都仍然可以使用；請同你嘅醫療團隊一齊商量。

詞彙解釋

GSM

更年期泌尿生殖綜合症 — 雌激素不足引起嘅乾澀、黏膜萎縮同泌尿症狀。

陰道雌激素

放入陰道使用嘅低劑量雌激素（乳霜、藥片或藥環）。

局部 vs. 全身

局部係在使用位置發揮效用；全身（藥片／貼片）會影響整個身體。

維持劑量

頭幾個星期後減少使用嘅持續劑量。

反覆 UTI

反覆發生嘅膀胱感染，陰道雌激素有助預防。

保濕劑／潤滑劑

可以同時配合使用嘅非荷爾蒙產品。

幾耐先見效？ 好多人幾個星期內已經感覺到改善，大約 8–12 個星期後效果最完整。呢個藥只係在持續使用時先有效，係長期照顧嘅一部分 — 停用後症狀通常會返嚟。

點樣用

- 1 **開始階段：**大部分形式係**每晚使用約 2 個星期**，令黏膜恢復。
- 2 **維持階段：**之後減至**每週約兩次**（藥環每 3 個月更換一次）。
- 3 睡前使用，咁藥物可以留嚟原位；使用前後洗手。
- 4 長期持續使用 — 長期用係安全嘅，效果需要定期使用先可以維持。

可選嘅形式

- **乳霜** — 用塗藥器，劑量靈活
- **藥片／陰道塞** — 整潔，劑量預先量好
- **藥環** — 每 3 個月放置一次，方便省事

需要知道嘅事

- 可以同時使用非荷爾蒙**保濕劑或潤滑劑**增加舒適感。
- 開始使用時少量分泌物或點滴出血係常見嘅，通常會自行好轉。
- 可以配合盆底運動同其他膀胱治療一齊使用。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 更年期後有任何**陰道出血** — 一定要檢查
- 發現新嘅乳房腫塊或異常症狀
- 刺激感非但有改善，反而加重咗

要記住嘅三件事

1. 陰道雌激素係低劑量、局部治療，專門針對更年期相關嘅乾澀、性交疼痛同泌尿症狀 — 進入身體嘅份量非常少。
2. 頭約 2 個星期每晚使用，之後每週兩次長期維持（或每 3 個月換藥環一次）；效果靠持續使用先可以維持。
3. 大多數人用起嚟都係安全嘅 — 有癌症病史請同醫療團隊商量。更年期後出血一定要報告。