

योनि प्रसव के दौरान, योनि और गुदा के बीच का क्षेत्र (पेरिनियम) फट सकता है। तृतीय डिग्री का टियर गुदा स्फिंक्टर मांसपेशी तक पहुँचता है; चतुर्थ डिग्री का टियर उसके आगे मलाशय की परत तक जाता है। इन्हें साथ मिलाकर **OASIS** कहते हैं। प्रसव के तुरंत बाद इनकी सावधानी से मरम्मत की जाती है, और अच्छी देखभाल से अधिकांश महिलाएँ ठीक हो जाती हैं।

क्या हुआ

गुदा स्फिंक्टर वह मांसपेशी वलय है जो गैस और मल को रोकती है। गंभीर टियर इस मांसपेशी को प्रभावित करता है, इसीलिए सावधानीपूर्वक मरम्मत और follow-up ज़रूरी है — ताकि आपका दीर्घकालिक मल नियंत्रण सुरक्षित रहे। इस टियर में आपकी कोई गलती नहीं है।

मरम्मत

मरम्मत प्रसव के तुरंत बाद की जाती है, आमतौर पर ऑपरेशन थिएटर में अच्छे एनेस्थीसिया (अक्सर spinal या epidural) के साथ। सर्जन ऊतकों को **परत दर परत** जोड़ते हैं — स्फिंक्टर मांसपेशी को, और चतुर्थ डिग्री में मलाशय की परत को भी — घुलनशील टाँकों से। आपको antibiotics और दर्द नियंत्रण की योजना दी जाएगी।

शब्दों को समझें

पेरिनियम

योनि और गुदा के बीच का क्षेत्र।

OASIS

प्रसव-संबंधी गुदा स्फिंक्टर चोट — 3rd या 4th डिग्री टियर।

गुदा स्फिंक्टर

वह मांसपेशी वलय जो गैस और मल को नियंत्रित करता है।

तृतीय डिग्री

गुदा स्फिंक्टर मांसपेशी तक का टियर।

चतुर्थ डिग्री

स्फिंक्टर से आगे मलाशय की परत तक का टियर।

Stool softener

मल को नरम रखने वाली दवा ताकि उपचार के दौरान ज़ोर न लगाना पड़े।

Pelvic-floor PT

उपचार के बाद ताकत और समन्वय बहाल करने की थेरेपी।

क्या मुझे स्थायी समस्याएँ होंगी? अधिकांश महिलाएँ अच्छी तरह ठीक होती हैं और सामान्य नियंत्रण वापस पाती हैं। कुछ को गैस या मल रोकने में कठिनाई हो सकती है, इसीलिए follow-up और pelvic-floor थेरेपी ज़रूरी है — और यदि लक्षण बने रहें तो प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं। किसी भी leakage के बारे में अपनी टीम को बताएँ, प्रतीक्षा न करें।

उपचार & स्व-देखभाल

- 1 मल नरम रखें** — दी गई stool softener लें, पानी पिएँ, और fiber युक्त आहार लें ताकि ज़ोर न लगे।
- 2 दर्द नियंत्रण & स्वच्छता** — दी गई दर्द निवारक दवा लें, शौच के बाद गर्म पानी से धोएँ, और क्षेत्र को साफ़ व सूखा रखें।
- 3 आराम करें** — अपने शिशु से अधिक भार न उठाएँ; हफ़्तों में धीरे-धीरे सुधार होगा।
- 4 Pelvic-floor physical therapy** — प्रारंभिक उपचार के बाद ताक़त बहाल करने में मदद करती है।

Follow-Up & भविष्य के प्रसव

- मरम्मत के उपचार और मल नियंत्रण की जाँच की जाएगी।
- भविष्य के प्रसव** के बारे में चर्चा करें — आपकी टीम अगली बार सबसे सुरक्षित विकल्प बताएगी।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार, बढ़ता दर्द, या बदबूदार discharge (संभावित संक्रमण)
- घाव खुलता हुआ लगे
- गैस या मल का रिसाव, या नया नियंत्रण खोना
- गंभीर कब्ज या मल त्याग न होना

ध्यान रखें

- आरामदायक तरीके से बैठें (cushion मददगार हो सकता है) और सूजन के लिए शुरुआत में बर्फ लगाएँ।
- जब तक टीम न कहे, मलाशय में कुछ न डालें (suppository/enema नहीं)।

याद रखने योग्य तीन बातें

- 3rd या 4th डिग्री टियर (OASIS) में गुदा स्फिक्टर शामिल होता है और प्रसव के तुरंत बाद परत दर परत मरम्मत की जाती है।
- मल नरम रखें, घाव की देखभाल करें, और pelvic-floor थेरेपी करें — अधिकांश महिलाएँ ठीक होती हैं।
- गैस या मल का रिसाव, बुखार, या घाव खुलना — इन्हें तुरंत बताएँ; जल्दी मदद से बेहतर परिणाम मिलते हैं।