

पेरोनी रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिंग की दीवार में निशान ऊतक (**plaque**) बन जाता है, जिससे लिंग मुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, या छोटा हो जाता है — और कभी-कभी स्तंभन के दौरान दर्द होता है। इससे यौन संबंध मुश्किल हो सकते हैं। यह आम है, यह कैंसर नहीं है, और इसका प्रभावी इलाज संभव है — सही उपचार अवस्था पर निर्भर करता है।

इस स्थिति के बारे में

पेरोनी रोग आमतौर पर दो चरणों में बढ़ता है:

- **सक्रिय (acute) चरण** — वक्रता बदल रही हो और दर्द हो, अक्सर 6–18 महीनों तक।
- **स्थिर (stable) चरण** — वक्रता और plaque स्थिर हो जाते हैं और दर्द आमतौर पर कम हो जाता है।

उपचार के विकल्प इस पर निर्भर करते हैं कि आप किस चरण में हैं, इसलिए आपकी चिकित्सा टीम पूछेगी कि समय के साथ क्या बदलाव आए।

कारण

माना जाता है कि यौन संबंध के दौरान मामूली चोट के बाद सामान्य ऊतक की जगह असामान्य निशान बन जाता है। यह उम्र के साथ, मधुमेह के रोगियों में, प्रोस्टेट सर्जरी के बाद, और जिन पुरुषों को **Dupuytren's contracture** (हाथ की उँगलियों का सिकुड़ना) है, उनमें अधिक देखा जाता है।

शब्दों को समझें

पेरोनी रोग

लिंग में निशान ऊतक जो वक्रता या विकृति पैदा करता है।

Plaque

निशान ऊतक का वह हिस्सा जो मुड़ाव का कारण बनता है।

सक्रिय बनाम स्थिर

वक्रता अभी बदल रही है या स्थिर हो गई है।

Traction therapy

एक उपकरण जो लिंग को धीरे से खींचकर वक्रता/लंबाई सुधारता है।

Collagenase (Xiaflex)

एक इंजेक्शन की दवा जो plaque को तोड़ती है।

Plication / grafting

लिंग को सीधा करने के सर्जिकल तरीके।

क्या मुझे जल्दी सर्जरी करानी चाहिए? आमतौर पर नहीं। **सक्रिय चरण** में वक्रता अभी बदल रही होती है, इसलिए ध्यान आराम और गैर-शल्य विकल्पों पर होता है। सर्जरी तब दी जाती है जब स्थिति **स्थिर** हो जाती है (वक्रता और दर्द दोनों शांत हो जाएँ)। कई पुरुषों में सर्जरी के बिना भी सुधार होता है।

जाँच कैसे होती है

- वक्रता, दर्द और समय के साथ बदलाव का इतिहास
- plaque को महसूस करने के लिए जाँच; कभी-कभी स्तंभन की तस्वीरें या क्लिनिक में मूल्यांकन
- कभी-कभी plaque और रक्त प्रवाह देखने के लिए ultrasound

इलाज कैसे होता है (चरण के अनुसार)

- 1 **सक्रिय चरण** — आश्वासन, दर्द नियंत्रण, और अक्सर **traction therapy**; लक्ष्य स्थिति को बिगड़ने से रोकना है।
- 2 **Plaque injections — collagenase (Xiaflex)** जैसी दवाएँ plaque में इंजेक्ट करके वक्रता कम करती हैं।
- 3 **सर्जरी (स्थिर चरण)** — **plication** (लंबे हिस्से में टाँके; सरल, थोड़ा छोटा हो सकता है) या **plaque incision/grafting** (लंबाई बनाए रखने के लिए, गंभीर वक्रता में)।
- 4 **लिंग प्रत्यारोपण (penile implant)** — यदि स्तंभन दोष (ED) भी हो। हर विकल्प का अलग handout है।

ज़रूरी बातें

- लिंग को जबरदस्ती सीधा करने की कोशिश न करें — इससे चोट बढ़ सकती है।
- अगर वक्रता यौन संबंध में रुकावट नहीं डालती, तो केवल निगरानी भी पर्याप्त हो सकती है।
- पेरोनी रोग मनोदशा और रिश्तों पर असर डाल सकता है — सहायता लेना फायदेमंद है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- वक्रता जो **यौन संबंध रोके**, या बिगड़ता मुड़ाव
- स्तंभन के दौरान गंभीर दर्द
- वक्रता के साथ नया **स्तंभन दोष (ED)**

याद रखने योग्य तीन बातें

1. पेरोनी रोग निशान ऊतक से होता है — आम है, कैंसर नहीं, और इलाज योग्य है।
2. उपचार चरण पर निर्भर करता है: सक्रिय में आराम और गैर-शल्य विकल्प; स्थिर होने पर सीधा करने की प्रक्रिया।
3. कई पुरुषों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यौन संबंध में रुकावट, लगातार दर्द, या नए ED के लिए अपनी टीम से मिलें।