

सैक्रोकोल्पोपेक्सी योनि के शीर्ष या गर्भाशय के प्रोलैप्स (अंग खिसकना) के लिए सबसे टिकाऊ सर्जरियों में से एक है। एक मुलायम mesh योनि के शीर्ष को उठाकर टेलबोन (sacrum) की मज़बूत ligament से जोड़ दी जाती है, जिससे अंग अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। यह आमतौर पर keyhole (रोबोटिक या laparoscopic) सर्जरी से की जाती है और संभोग की क्षमता बनी रहती है।

इस सर्जरी के बारे में

एक **mesh** का टुकड़ा योनि के शीर्ष के आगे और पीछे जोड़ा जाता है, फिर उसे **sacrum** की मज़बूत ligament से बाँध दिया जाता है। इससे योनि अपनी सामान्य स्थिति में टिकी रहती है। यह apical प्रोलैप्स के लिए **gold-standard** सर्जरी मानी जाती है क्योंकि इसके परिणाम बहुत टिकाऊ होते हैं।

Mesh के बारे में

यहाँ उपयोग की गई mesh **पेट के रास्ते** लगाई जाती है और इसका सुरक्षा रिकॉर्ड अच्छी तरह से जाँचा-परखा है। यह उस transvaginal (योनि के रास्ते) mesh से **बिल्कुल अलग** है जिसे FDA चेतावनी के बाद बाज़ार से हटाया गया था। आपके सर्जन mesh exposure जैसे दुर्लभ जोखिम के बारे में चर्चा करेंगे।

शब्दों को समझें

Apex / vault

योनि का शीर्ष, जो प्रसव या hysterectomy के बाद नीचे आ सकता है।

Sacrum

रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की हड्डी; इसकी ligament सर्जरी को टिकाती है।

Mesh

एक मुलायम, स्थायी सामग्री जो योनि के शीर्ष को सहारा देती है।

Robotic / laparoscopic

कुछ छोटे cuts के ज़रिए keyhole सर्जरी।

Mesh exposure

एक असामान्य समस्या जिसमें mesh का छोटा हिस्सा दिखने लगता है; उपचार योग्य।

Hysterectomy

गर्भाशय को हटाना, जो कभी-कभी एक साथ किया जाता है।

क्या इसमें दर्द होगा? यह जनरल एनेस्थीसिया में होती है, इसलिए दौरान कुछ महसूस नहीं होता। Keyhole सर्जरी में अधिकतर लोगों को छोटे cuts पर हल्की तकलीफ और गैस की परेशानी होती है; ज़्यादातर उसी दिन या एक रात बाद घर जाते हैं। बड़ी (open) सर्जरी में थोड़ा अधिक समय लगता है।

तैयारी कैसे करें

- **जनरल एनेस्थीसिया** में होती है — खाली पेट रहने और दवाओं (blood thinners बंद करने) के निर्देशों का पालन करें।
- Pre-op जाँच; **hysterectomy** और/या incontinence की सर्जरी एक साथ हो सकती है।
- धूम्रपान न करें; घर पर सवारी और मदद का इंतज़ाम करें।

क्या होता है

- 1 आप बेहोश होती हैं; antibiotics दी जाती हैं।
- 2 Keyhole cuts (या एक बड़े cut) से mesh को योनि के शीर्ष से जोड़ा जाता है।
- 3 Mesh को sacral ligament से बाँधकर योनि को सही स्थान पर उठाया जाता है।
- 4 थोड़े समय के लिए कैथेटर लगाया जाता है।

बाद में

- उसी दिन या एक रात बाद घर; शुरू में हल्की गतिविधि करें।
- **लगभग 6 हफ्ते तक भारी सामान उठाने, ज़ोर लगाने और संभोग से बचें।**
- हल्की spotting और हल्की तकलीफ सामान्य है; कब्ज का उपचार करें।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना
- अधिक रक्तस्राव, या पेट/पेल्विक दर्द बढ़ना
- **पेशाब न आना**, या लगातार मतली/उल्टी
- योनि से बदबूदार discharge, या बाद में संभोग में दर्द (संभावित mesh समस्या)

याद रखने योग्य तीन बातें

1. सैक्रोकोल्पोपेक्सी योनि के शीर्ष को sacrum से जुड़ी mesh से उठाती है — apical प्रोलैप्स की सबसे टिकाऊ सर्जरी, आमतौर पर keyhole।
2. इसकी पेट वाली mesh अच्छी तरह जाँची गई है और वापस ली गई transvaginal prolapse mesh से बिल्कुल अलग है।
3. ~6 हफ्ते तक भारी काम और संभोग से बचें। बुखार, अधिक रक्तस्राव, पेशाब न आना, या बाद में दुर्गंध/दर्द पर तुरंत बुलाएँ।