

सिंपल प्रोस्टेटेक्टॉमी

WARWIKI

रोगी जानकारी · बहुत बड़े बड़े हुए प्रोस्टेट (BPH) के लिए सर्जरी

सिंपल प्रोस्टेटेक्टॉमी एक सर्जरी है जो बहुत बड़े बड़े हुए प्रोस्टेट (BPH) के कारण पेशाब में रुकावट होने पर की जाती है। सर्जन प्रोस्टेट के अंदर के उभरे हुए हिस्से को पेट के रास्ते निकालते हैं — खुली सर्जरी या robotic/keyhole सर्जरी से। बड़े प्रोस्टेट के लिए यह बहुत प्रभावी है।

एक ज़रूरी अंतर

“सिंपल” प्रोस्टेटेक्टॉमी “रैडिकल” प्रोस्टेटेक्टॉमी से **अलग** है। रैडिकल ऑपरेशन में पूरा प्रोस्टेट **कैंसर** के इलाज के लिए निकाला जाता है। **सिंपल** प्रोस्टेटेक्टॉमी में केवल अंदर का बढ़ा हुआ (सामान्य) ऊतक निकाला जाता है, बाहरी खोल रहती है — यह **कैंसर-रहित बढ़ोतरी से होने वाली रुकावट** का इलाज करती है।

कब की जाती है

- **बहुत बड़े प्रोस्टेट** के लिए जो TURP जैसी सामान्य scope प्रक्रिया के लिए उपयुक्त न हो
- विशेष रूप से जब **मूत्राशय की पथरी** या बड़े मूत्राशय की थैलियाँ भी हों
- बड़े प्रोस्टेट के लिए scope आधारित विकल्प (**HoLEP, Aquablation**) भी उपलब्ध हैं — आपके सर्जन आपके लिए सबसे उचित विकल्प बताएँगे

शब्दों को समझें

सिंपल प्रोस्टेटेक्टॉमी

BPH के लिए प्रोस्टेट का अंदरूनी हिस्सा निकालना (कैंसर के लिए नहीं)।

Adenoma

प्रोस्टेट का वह सामान्य अंदरूनी ऊतक जो निकाला जाता है।

रैडिकल प्रोस्टेटेक्टॉमी

एक अलग ऑपरेशन जिसमें कैंसर के लिए पूरा प्रोस्टेट निकाला जाता है।

Open बनाम robotic

एक बड़े चीरे से, या छोटे keyhole चीरों से।

प्रतिगामी वीर्यपात

Dry orgasm — एक सामान्य दुष्प्रभाव।

Catheter

एक नली जो कुछ दिनों तक मूत्राशय को निकासी देती है।

क्या इसमें दर्द होगा? यह जनरल एनेस्थीसिया में होती है, इसलिए दौरान कुछ महसूस नहीं होता। यह पेट की सर्जरी है, इसलिए ठीक होने में **scope प्रक्रिया से अधिक समय** लगता है — कुछ दिन अस्पताल में (robotic सर्जरी में कम), कई दिन catheter, और कुछ हफ्ते सीमित गतिविधि।

तैयारी कैसे करें

- **जनरल एनेस्थीसिया** दी जाती है — खान-पान और दवाओं के निर्देश मानें (खून पतला करने वाली दवाएँ बताए अनुसार बंद करें)।
- संक्रमण न हो इसके लिए पहले **urine test**।
- धूम्रपान न करें; घर पर लाने और मदद का इंतज़ाम करें।

क्या होता है & बाद में

- 1 आप बेहोश रहते हैं; antibiotics दी जाती हैं।
- 2 पेट के रास्ते (open) या robotic/keyhole से प्रोस्टेट का अंदरूनी हिस्सा निकाला जाता है, बाहरी खोल छोड़ी जाती है।
- 3 Catheter (और कभी-कभी drain) लगाया जाता है; अस्पताल में कुछ दिन (robotic में कम)।
- 4 Catheter आमतौर पर **कई दिन से लगभग एक हफ्ते** तक रहता है।

शुरुआत में पेशाब में खून आ सकता है; कई हफ्तों तक **भारी सामान न उठाएँ और ज़ोर न लगाएँ**।

बाद में क्या उम्मीद करें

- पेशाब का बहाव मज़बूत और टिकाऊ रूप से बेहतर होगा।
- **प्रतिगामी वीर्यपात** (dry orgasm) सामान्य है; स्तंभन (erection) या मूत्र नियंत्रण पर गंभीर असर दुर्लभ है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- Catheter निकलने के बाद **पेशाब न आए**
- **भारी रक्तस्राव या थक्के**, या बुखार/ठंड लगना
- पेट दर्द बढ़े, या घाव में लालिमा/रिसाव
- सीने में दर्द, साँस लेने में तकलीफ, या पैर में सूजन-दर्द (आपातकाल)

याद रखने योग्य तीन बातें

1. सिंपल प्रोस्टेटेक्टॉमी बहुत बड़े BPH के लिए प्रोस्टेट का अंदरूनी हिस्सा निकालती है — यह कैंसर का ऑपरेशन **नहीं** है (जो पूरा प्रोस्टेट निकालता है)।
2. बड़े प्रोस्टेट के लिए बहुत प्रभावी है; ठीक होने में scope प्रक्रियाओं (HoLEP/Aquablation) से अधिक समय लगता है।
3. Dry ejaculation और कई दिन catheter की उम्मीद रखें। पेशाब न आने, भारी रक्तस्राव, या बुखार पर तुरंत बुलाएँ।