

Tiêm vào thể hang (Tiêm dương vật điều trị rối loạn cương dương) **WARWIKI**

Thông tin cho bệnh nhân · Phương pháp tự tiêm điều trị rối loạn cương dương

Tiêm vào thể hang (ICI) là phương pháp điều trị rối loạn cương dương, trong đó bạn tự tiêm một lượng nhỏ thuốc vào cạnh dương vật bằng kim tiêm rất nhỏ để tạo ra sự cương dương. Phương pháp này được dùng khi thuốc uống không hiệu quả hoặc không phù hợp. Mặc dù nghe có vẻ đáng sợ, nhưng kim tiêm rất nhỏ, hầu hết nam giới gần như không cảm thấy đau, và đây là một trong những phương pháp điều trị không phẫu thuật đáng tin cậy nhất.

Về phương pháp điều trị này

Thuốc (thường là **alprostadil**, hoặc hỗn hợp pha chế gọi là **bimix** hoặc **trimix**) giúp giãn mạch máu trong thể hang, cho phép máu chảy vào. Thuốc có tác dụng **dù bạn có hưng phấn hay không**, thường tạo ra sự cương dương trong khoảng **5–15 phút** và kéo dài khoảng 30–60 phút.

- **Lần đầu tiêm được thực hiện tại phòng khám** để xác định liều lượng phù hợp và đảm bảo an toàn cho bạn.
- Sau đó bạn sẽ được hướng dẫn **tự tiêm tại nhà**.
- Phương pháp này thường hiệu quả ngay cả khi thuốc uống thất bại, kể cả sau phẫu thuật tuyến tiền liệt.

Có an toàn không?

Với hầu hết nam giới, có — khi liều lượng được điều chỉnh cẩn thận. Nguy cơ quan trọng nhất là **cương đau kéo dài (cương dương vật kéo dài bất thường)** trên 4 giờ, đây là tình trạng cấp cứu. Các tác dụng khác gồm đau nhẹ sau tiêm, đôi khi bầm tím, và theo thời gian có thể xuất hiện các vùng cứng (sẹo) tại chỗ tiêm — xoay vị trí tiêm giúp phòng ngừa điều này.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Rối loạn cương dương (ED)

Khó đạt hoặc duy trì sự cương dương đủ cứng để quan hệ tình dục.

Thể hang (intracavernosal)

Bên trong các buồng cương của dương vật (corpora cavernosa).

Alprostadil

Thuốc tiêm đơn thành phần phổ biến điều trị rối loạn cương dương.

Trimix / bimix

Hỗn hợp pha chế gồm hai hoặc ba thuốc dùng để tiêm.

Hiệu chỉnh liều (titration)

Xác định liều đúng cho bạn, thường bắt đầu tại phòng khám.

Cương đau kéo dài (priapism)

Sự cương dương kéo dài trên 4 giờ — tình trạng cấp cứu y tế.

Thuốc ức chế PDE5

Thuốc uống điều trị rối loạn cương dương (như sildenafil); ICI là lựa chọn khi thuốc uống thất bại.

CÓ ĐAU KHÔNG? Kim tiêm rất nhỏ và được đưa vào cạnh thân dương vật, nơi hầu hết nam giới chỉ cảm thấy đau nhẹ như véo nhỏ — không phải vùng nhạy cảm phía trên hay phía dưới. Đau âm ỉ nhẹ sau tiêm là bình thường, đặc biệt với alprostadil. Nhóm chăm sóc sẽ theo dõi lần tiêm đầu tiên để đảm bảo bạn thoải mái và an toàn.

Cách sử dụng an toàn

- 1 **Lần đầu tiêm tại phòng khám** để xác định liều đúng — tuyệt đối không tự tăng liều.
- 2 Tiêm vào **cạnh thân dương vật** (vị trí khoảng 3 hoặc 9 giờ); **tránh phía trên và phía dưới, và đổi bên** mỗi lần tiêm.
- 3 Ấn chặt vào vị trí tiêm vài phút sau để hạn chế bầm tím.
- 4 Chỉ dùng **đúng tần suất nhóm chăm sóc hướng dẫn** — thường không quá một lần trong 24 giờ hoặc khoảng 3 lần mỗi tuần.

Cách chuẩn bị

- Bảo quản thuốc theo hướng dẫn (một số hỗn hợp cần để lạnh).
- Thông báo cho nhóm chăm sóc về **thuốc làm loãng máu** và các bệnh tim mạch.
- Có thể mời người thân cùng dự buổi hướng dẫn nếu điều đó giúp bạn thoải mái hơn.

Đến cấp cứu ngay nếu:

- Sự cương dương kéo dài **hơn 4 giờ** (cương đau kéo dài) — đến phòng cấp cứu ngay; chờ đợi có thể gây tổn thương vĩnh viễn
- Bạn bị đau dữ dội, chảy máu nhiều hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng tại chỗ tiêm
- Bạn cảm thấy choáng váng hoặc đau ngực sau khi tiêm

Cần biết thêm

- Mang theo thông tin về liều lượng và thời gian do nhóm chăm sóc cung cấp.
- Báo cáo ngay nếu xuất hiện khối cứng mới hoặc dương vật bị cong.

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. ICI dùng kim tiêm nhỏ đưa thuốc vào cạnh dương vật, tạo sự cương dương đáng tin cậy trong khoảng 5–15 phút — hiệu quả khi thuốc uống thất bại.
2. Liều đầu tiên được xác định tại phòng khám; không tự tăng liều, xoay vị trí tiêm và không vượt quá giới hạn được cho phép.
3. Sự cương dương kéo dài **hơn 4 giờ là cấp cứu** — đến phòng cấp cứu ngay lập tức.