

Băng Nâng Niệu Đạo Nam

Thông tin cho bệnh nhân · Băng nâng niệu đạo để điều trị tiểu không kiểm soát sau phẫu thuật tuyến tiền liệt **WARWIKI**

Băng nâng niệu đạo nam (male urethral sling) là một dải lưới mềm đặt bên dưới niệu đạo (ống dẫn nước tiểu ra ngoài) để điều trị tiểu không kiểm soát — thường là tiểu rỉ khi ho, nâng vật nặng hoặc vận động sau phẫu thuật tuyến tiền liệt. Băng nâng nâng đỡ niệu đạo giúp bạn kiểm soát nước tiểu tốt hơn. Khác với cơ thắt nhân tạo, thiết bị này không cần thao tác gì. Từ thông tin này giải thích cách thực hiện, cách chuẩn bị và những điều cần biết sau phẫu thuật.

Về ca phẫu thuật này

Tiểu rỉ khi vận động, ho hoặc nâng vật nặng gọi là **tiểu không kiểm soát khi gắng sức**, thường xảy ra sau phẫu thuật tuyến tiền liệt.

Băng nâng điều trị tình trạng này bằng cách đặt một dải lưới mềm bên dưới niệu đạo và nhẹ nhàng đưa niệu đạo về vị trí bình thường.

Băng nâng **đỡ** niệu đạo thay vì siết chặt lại, do đó sau khi hồi phục bạn **đi tiểu bình thường** — không có bơm, nút hay thiết bị nào cần thao tác.

Điều cần biết

Băng nâng hiệu quả nhất với tiểu rỉ **mức độ nhẹ đến trung bình** ở những người còn một phần chức năng cơ thắt, bác sĩ phẫu thuật sẽ kiểm tra điều này trước. Với tiểu rỉ nặng hơn hoặc nếu bạn đã **xạ trị vùng chậu, cơ thắt niệu đạo nhân tạo (AUS)** thường là lựa chọn tốt hơn — bác sĩ sẽ thảo luận phương án phù hợp. Băng nâng có thể **giảm** đáng kể tiểu rỉ nhưng không nhất thiết ngừng hoàn toàn; nếu chưa đủ, vẫn có thể đặt cơ thắt nhân tạo sau.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Tiểu không kiểm soát khi gắng sức

Tiểu rỉ khi vận động, ho hoặc nâng vật nặng.

Niệu đạo

Ống dẫn nước tiểu ra khỏi cơ thể.

Băng nâng (sling)

Dải lưới mềm đặt bên dưới niệu đạo để nâng đỡ niệu đạo.

Kiểm tra tái định vị

Soi camera nhỏ bên trong để xác nhận việc nâng niệu đạo có khả năng giúp ích.

Bí tiểu

Khó làm rỗng bàng quang tạm thời sau phẫu thuật; có thể cần đặt ống thông trong thời gian ngắn.

Cơ thắt nhân tạo (AUS)

Thiết bị thay thế có bơm, thường dùng cho tiểu rỉ nặng hơn.

Gây mê toàn thân

Thuốc giúp bạn ngủ sâu và không đau trong suốt ca phẫu thuật.

CÓ ĐAU KHÔNG? Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê toàn thân hoặc gây tê tùy sống, nên bạn không cảm thấy gì trong khi mổ. Sau đó, dự kiến bị đau nhức, sưng và bầm tím ở vùng bẹn và đáy chậu (vùng giữa búi và hậu môn) trong vài tuần — chườm đá, mặc quần đỡ búi và dùng thuốc giảm đau sẽ giúp ích. Ca phẫu thuật kéo khoảng một tiếng và nhiều người được về nhà trong ngày.

Cách chuẩn bị (Trước phẫu thuật)

- Phẫu thuật dưới **gây mê toàn thân hoặc gây tê tùy sống** — tuân thủ mọi hướng dẫn phẫu thuật (nhịn ăn, và thuốc nào cần ngưng, kể cả thuốc làm loãng máu).
- **Xét nghiệm nước tiểu** kiểm tra nhiễm trùng (điều trị trước nếu có), và **nội soi bàng quang (cystoscopy)** xác nhận băng nâng có khả năng giúp ích.
- **Không hút thuốc**, kiểm soát cân nặng và đường huyết, dùng kháng sinh theo chỉ định — băng nâng là thiết bị lưới cấy vào cơ thể.

Hãy báo cho nhóm chăm sóc trước nếu bạn:

- Đã **xạ trị vùng chậu** — băng nâng thường ít hiệu quả hơn, cơ thất nhân tạo có thể là lựa chọn tốt hơn
- Đã phẫu thuật điều trị tiểu không kiểm soát trước đây, hoặc có hẹp niệu đạo
- Đang bị nhiễm trùng ở bất kỳ vị trí nào

Quá trình phẫu thuật

- 1 Bạn được ngủ sâu hoặc tê liệt từ thắt lưng xuống dưới gây mê, và được tiêm kháng sinh.
- 2 Qua các vết rạch nhỏ ở bẹn và vùng đáy chậu, bác sĩ phẫu thuật đưa dải lưới (băng nâng) qua dưới niệu đạo và nâng lên đúng vị trí.
- 3 Băng nâng được cố định, các vết rạch được khâu lại, và thường đặt ống thông trong thời gian ngắn.

Sau phẫu thuật

- Dự kiến **đau nhức, sưng và bầm tím** vùng bẹn và đáy chậu trong 1–2 tuần. Chườm đá, mặc quần đỡ búi và dùng thuốc giảm đau.
- **Tránh nâng vật nặng, rặn, đạp xe và quan hệ tình dục** trong vài tuần (thường khoảng 6 tuần) — rặn mạnh có thể làm lệch băng nâng trước khi lành.
- Bạn có thể **khó đi tiểu tạm thời** và cần ống thông trong thời gian ngắn; tình trạng này thường tự hết.
- Tiếp tục dùng băng vệ sinh lúc đầu — sự cải thiện có thể xảy ra dần trong những tuần tiếp theo. **Không cần thao tác gì**; sau khi lành, bạn đi tiểu bình thường.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc hoặc đến cơ sở y tế nếu bạn có:

- **Không thể đi tiểu** được
- Sốt hoặc ớn lạnh, hoặc vết mổ ngày càng đỏ, đau hoặc chảy dịch
- Đau bẹn hoặc đáy chậu ngày càng tăng

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Băng nâng niệu đạo nam là dải lưới đặt bên dưới niệu đạo để nâng đỡ, cải thiện kiểm soát nước tiểu sau phẫu thuật tuyến tiền liệt — không cần thao tác gì.
2. Hiệu quả nhất với tiểu rỉ **mức nhẹ đến trung bình**; với tiểu rỉ nặng hoặc sau xạ trị, cơ thất nhân tạo thường tốt hơn — và vẫn có thể đặt sau nếu cần.
3. Sau phẫu thuật, **tránh nâng vật nặng, rặn, đạp xe và quan hệ** trong vài tuần để băng nâng lành. Có thể khó đi tiểu tạm thời — gọi ngay nếu không tiểu được hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng.