

Bộ Phận Giả Dương Vật Dạng Dẻo

Thông tin cho bệnh nhân · Thanh nâng bán cứng, có thể uốn cong, dành cho rối loạn cương dương

WARWIKI

Bộ phận giả dương vật dạng dẻo — còn gọi là bộ phận giả bán cứng — gồm hai thanh nâng chắc, có thể uốn cong được đặt bên trong dương vật, dành cho những nam giới bị rối loạn cương dương không cải thiện dù đã dùng thuốc, tiêm hoặc các phương pháp khác. Không cần bơm: bạn chỉ cần uốn dương vật lên khi quan hệ và uốn xuống để che giấu. Từ thông tin này giải thích cách hoạt động, cách chuẩn bị và những gì cần biết.

Về ca phẫu thuật này

Khi **rối loạn cương dương (ED)** không cải thiện dù đã dùng thuốc, thiết bị hút chân không hay tiêm thuốc, bộ phận giả là bước tiếp theo đáng tin cậy nhất. Bộ phận giả dạng dẻo là loại đơn giản nhất — hai thanh nâng có lớp phủ mềm, uốn cong được đặt vào bên trong dương vật. Dương vật luôn đủ cứng để quan hệ, và bạn tự điều chỉnh bằng tay:

- Uốn **lên** khi quan hệ tình dục
- Uốn **xuống** để che giấu dưới quần áo

Vì không có bơm, bình chứa hay chất lỏng, đây là loại bộ phận giả **đơn giản nhất và bền nhất** — phù hợp nếu việc thao tác bơm gặp khó khăn (ví dụ, khi sức cầm nắm yếu).

Điều cần biết

Giống như tất cả các loại bộ phận giả dương vật, đây là **lựa chọn vĩnh viễn**: việc đặt thiết bị làm thay đổi mô cương dương, nên sau đó cương dương tự nhiên và các phương pháp điều trị ED khác (thuốc, tiêm) sẽ không còn hiệu quả. Thiết bị **không ảnh hưởng đến đi tiểu, cảm giác, cực khoái hay xuất tinh**. So với loại bơm phồng: dương vật luôn cứng, nên che giấu có thể khó hơn một chút và cảm giác không giống cương tự nhiên — nhưng đơn giản hơn và bền hơn.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Rối loạn cương dương (ED)

Khó đạt hoặc duy trì cương dương đủ cứng để quan hệ.

Bộ phận giả dương vật

Thiết bị đặt vào dương vật để tạo cương khi các phương pháp khác không hiệu quả.

Dạng dẻo / bán cứng

Thanh nâng uốn cong được, giữ dương vật cứng; bạn điều chỉnh bằng tay, không cần bơm.

Bộ phận giả bơm phồng

Loại chính khác — bơm để phồng và xả; tự nhiên hơn nhưng nhiều bộ phận hơn.

Che giấu

Uốn dương vật xuống để thiết bị không lộ dưới quần áo.

Gây mê toàn thân

Thuốc giúp bạn ngủ và không đau trong suốt quá trình phẫu thuật.

Bền

Dài lâu — không có bộ phận chứa chất lỏng nên ít hỏng hóc.

CÓ ĐAU KHÔNG? Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê toàn thân hoặc gây tê tùy sống, nên bạn không cảm thấy gì trong khi mổ. Sau đó, dương vật và bìu có thể đau, sưng và bầm trong vài tuần — băng nâng bìu, chườm lạnh và thuốc giảm đau sẽ giúp ích. Phẫu thuật thường ngắn (thường dưới một giờ) và thực hiện trong ngày. Không sử dụng thiết bị để quan hệ cho đến khi bác sĩ phẫu thuật cho phép.

Cách chuẩn bị (Trước phẫu thuật)

- Phẫu thuật dưới **gây mê toàn thân hoặc gây tê tùy sống** — làm theo mọi hướng dẫn trước mổ (nhịn ăn, và thuốc nào cần ngừng, kể cả thuốc làm loãng máu).
- **Phòng ngừa nhiễm trùng rất quan trọng với bộ phận giả:** mọi nhiễm trùng (kể cả nhiễm trùng tiểu) phải được điều trị trước; bạn sẽ tắm bằng xà phòng kháng khuẩn và được dùng kháng sinh.
- **Không hút thuốc hay dùng thuốc lá điện tử;** nếu có **tiểu đường**, nhóm chăm sóc sẽ yêu cầu kiểm soát tốt đường huyết — cả hai giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Hãy báo trước cho nhóm chăm sóc nếu bạn:

- Có **tiểu đường** hoặc bất kỳ tình trạng nào ảnh hưởng đến lành vết thương
- Đã từng phẫu thuật vùng chậu hoặc dương vật, xạ trị, hoặc đặt bộ phận giả trước đây

Quá trình phẫu thuật

- 1 Bạn được ngủ hoặc tê từ thắt lưng xuống dưới gây mê, và được dùng kháng sinh.
- 2 Qua một vết rạch nhỏ, bác sĩ đặt **một thanh nâng uốn cong vào mỗi trong hai buồng** của dương vật. Không có bơm hay bình chứa.
- 3 Vết rạch được khâu lại và dương vật được để ở tư thế xuống. Ống thông tiểu có thể được đặt tạm thời.

Sau phẫu thuật

- Dương vật và bìu có thể **sưng và bầm** trong 1–2 tuần. Mang băng nâng bìu, chườm lạnh, dùng thuốc giảm đau và giữ vết mổ sạch khô.
- **Không dùng thiết bị để quan hệ cho đến khi bác sĩ cho phép** — thường sau khoảng **4–6 tuần**, khi vết thương đã lành.
- Sau khi lành, **không cần học cách bơm** — bạn chỉ cần uốn dương vật lên khi sử dụng và uốn xuống để che giấu. Nhóm chăm sóc sẽ hướng dẫn bạn.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc hoặc tìm kiếm sự chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh, hoặc vết mổ ngày càng đỏ, đau, sưng hoặc chảy dịch
- Không thể đi tiểu
- Đau dữ dội hoặc tăng nặng, hoặc dương vật có màu xám xịt hoặc thâm đen

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Bộ phận giả dạng dẻo gồm hai thanh nâng uốn cong trong dương vật — uốn lên khi quan hệ, uốn xuống để che giấu. Không bơm; đây là loại đơn giản và bền nhất.
2. Đây là **lựa chọn vĩnh viễn** (cương tự nhiên và thuốc/tiêm sẽ không hiệu quả sau đó), nhưng **không ảnh hưởng đến đi tiểu, cảm giác, cực khoái hay xuất tinh**.
3. Phòng ngừa nhiễm trùng là quan trọng nhất: điều trị mọi nhiễm trùng trước, không hút thuốc, kiểm soát tiểu đường, dùng xà phòng kháng khuẩn và kháng sinh. Không dùng cho đến khi bác sĩ cho phép (~4–6 tuần).