

Bóng Phủ Thuốc Optilume

Thông tin cho bệnh nhân · Điều trị hẹp niệu đạo bằng bóng phủ thuốc

WARWIKI

Optilume là phương pháp điều trị ít xâm lấn cho chỗ hẹp (hẹp niệu đạo) của niệu đạo — ống dẫn nước tiểu ra khỏi cơ thể. Một bóng đặc biệt nong rộng chỗ hẹp, đồng thời giải phóng thuốc vào thành niệu đạo để giúp ngăn sẹo tái hình thành. Không cần cắt hay rạch da bên ngoài.

Về Thủ Thuật Này

Hẹp niệu đạo là đoạn bị sẹo, thu hẹp lại khiến dòng nước tiểu yếu đi. Chỉ nong hoặc rạch đơn thuần thường để chỗ hẹp tái phát. Optilume thực hiện hai việc cùng lúc:

- **Bóng nong rộng** đoạn bị sẹo.
- **Lớp phủ thuốc (paclitaxel)** trên bóng được đưa vào mô để làm chậm quá trình tạo sẹo trở lại.

Đây là lựa chọn phù hợp cho một số trường hợp **hẹp tái phát** ở niệu đạo hành (dưới bìu) **ngắn hơn khoảng 3 cm** và đã tái phát sau lần nong hoặc rạch trước. Phương pháp này bền vững hơn nong đơn thuần, nhưng **không thay thế được tạo hình niệu đạo** (phẫu thuật mở) — vốn là lựa chọn bền vững nhất. Bác sĩ sẽ giải thích phương án phù hợp cho bạn.

Có An Toàn Không?

Optilume ít xâm lấn, thực hiện qua niệu đạo, thường là ngoại trú. Nhìn chung được dung nạp tốt. Liều thuốc nhỏ và tập trung tại chỗ. Các rủi ro gồm tiểu ra máu hoặc có máu trong tinh dịch, rất ngắn, nhiễm trùng đường tiết niệu, và chỗ hẹp vẫn có thể tái phát theo thời gian.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Niệu đạo

Ống dẫn nước tiểu ra khỏi cơ thể.

Hẹp niệu đạo

Chỗ bị sẹo, thu hẹp trong niệu đạo khiến dòng nước tiểu yếu.

Niệu đạo hành

Phần niệu đạo nằm dưới bìu, nơi điều trị này hiệu quả nhất.

Bóng phủ thuốc

Bóng nong rộng chỗ hẹp và đưa thuốc vào thành niệu đạo.

Paclitaxel

Thuốc trên bóng giúp ngăn sẹo tái hình thành.

Nong

Làm rộng chỗ hẹp — ở đây thực hiện bằng bóng.

Ống nội soi (cystoscope)

Camera mỏng dùng để tìm và kiểm tra chỗ hẹp.

Ống thông

Ống mềm đặt vào niệu đạo trong thời gian ngắn sau thủ thuật.

CÓ ĐAU KHÔNG? Thủ thuật được thực hiện dưới gây mê hoặc an thần, nên bạn không cảm thấy gì trong lúc làm. Sau đó, có thể rất nhẹ, đau âm ỉ vùng chậu hoặc dương vật, và tiểu ra máu hoặc có máu trong tinh dịch một thời gian ngắn. Thường đặt ống thông trong thời gian ngắn. Thủ thuật nhanh, thường xuất viện trong ngày.

Cách Chuẩn Bị (Trước Thủ Thuật)

- Tuân theo **hướng dẫn gây mê hoặc an thần** (nhịn ăn uống, và các thuốc cần ngưng, bao gồm thuốc làm loãng máu).
- Xét nghiệm nước tiểu** kiểm tra nhiễm trùng — phải điều trị nhiễm trùng trước.
- Nhờ người đưa về nhà** và chuẩn bị đặt ống thông trong thời gian ngắn.

Hãy báo cho nhóm chăm sóc **trước** nếu bạn:

- Đang dùng **thuốc làm loãng máu**, hoặc đang bị nhiễm trùng đường tiết niệu
- Dự định có con** — do thuốc, bạn sẽ được yêu cầu dùng bao cao su và tránh thụ thai trong khoảng thời gian nhóm chăm sóc chỉ định

Quá Trình Thực Hiện

- Bạn được gây mê hoặc an thần; ống nội soi xác nhận chiều dài và vị trí chỗ hẹp.
- Dây dẫn mảnh được luồn qua chỗ hẹp, và khu vực được nong sơ bộ để đưa bóng vào.
- Bóng phủ thuốc được đặt chính giữa chỗ sẹo, bơm phồng trong thời gian nhất định để đưa thuốc vào mô.
- Bóng và ống nội soi được rút ra, sau đó đặt ống thông trong thời gian ngắn.

Sau Thủ Thuật

- Ống thông được rút sau **một thời gian ngắn**; nhóm chăm sóc sẽ cho bạn biết khi nào.
- Có thể **rất nhẹ và nước tiểu hoặc tinh dịch hơi hồng** trong vài ngày. Uống nhiều nước sẽ giúp ích.
- Tránh vận động mạnh** trong thời gian ngắn, và tái khám kiểm tra dòng tiểu hoặc triệu chứng.
- Dùng **bao cao su** trong thời gian nhóm chăm sóc khuyến nghị, vì thuốc trên bóng.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh
- Không tiểu được**, đặc biệt sau khi rút ống thông
- Chảy máu nhiều, hoặc cục máu đông trong nước tiểu
- Đau ngày càng tăng thay vì giảm

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- Optilume (bóng phủ thuốc) nong rộng chỗ hẹp niệu đạo và đưa thuốc vào để ngăn sẹo tái hình thành — đây là lựa chọn nội soi, không thay thế phẫu thuật tạo hình niệu đạo mở.
- Để chuẩn bị: tuân thủ hướng dẫn nhịn ăn và dùng thuốc, điều trị nhiễm trùng trước, nhờ người đưa về, và báo bác sĩ nếu bạn dự định có con.
- Rất nhẹ và tiểu ra máu hoặc có máu trong tinh dịch vài ngày là bình thường. Dùng bao cao su theo thời gian được chỉ định; gọi cho nhóm chăm sóc nếu sốt, chảy máu nhiều, hoặc không tiểu được.