

陰莖牽引治療

WARWIKI

病人須知 · 一種可穿戴裝置，透過輕柔牽拉嚟改善彎曲

陰莖牽引治療係用一個裝置，長時間對陰莖施加輕柔、持續嘅拉伸力。主要用於佩羅尼氏症（減少彎曲並幫助保持長度），亦用於陰莖康復—例如假體手術後維持長度。呢個係非手術療法，安全，但必須每日持續使用數個月先有效。

點樣運作

持續、輕柔嘅張力令組織同疤痕（斑塊）逐漸**重塑**，從而減少彎曲並幫助保持長度。效果係溫和而漸進嘅—呢係一個緩慢、穩定嘅療法，唔係即時見效。通常會同其他佩羅尼氏症治療一齊配合使用。

會點樣

- 你每日需要按照所用型號嘅說明書**佩戴指定時間**（部分型號佩戴時間較長；較新型號每日分幾次短時間使用）。
- 效果需要**數個月**先逐漸出現—堅持使用係關鍵。
- 最佳效果通常喺佩羅尼氏症嘅**活躍期**或配合其他治療時出現。

詞彙解釋

牽引治療

用裝置長時間輕柔拉伸陰莖。

佩羅尼氏症

令陰莖彎曲嘅疤痕組織—牽引治療嘅主要適應症。

斑塊

牽拉幫助重塑嘅疤痕組織。

陰莖康復

維持長度／功能，例如假體手術後。

活躍期 vs. 穩定期

佩羅尼氏症彎曲係仲喺變化中，定係已經穩定。

係咪真係有效？ 係可以帶來**溫和、真實嘅改善**—但只有堅持使用數個月先有效。好似陰莖嘅物理治療：需要時間，效果取決於堅持。單靠呢個療法唔能完全矯正嚴重彎曲，配合注射或手術效果更好。

安全使用方法

- 1 嚴格按照裝置說明書嘅**佩戴時間同張力**指示—唔好過度收緊。
- 2 喺陰莖鬆弛時使用；如果出現**麻木、顏色改變或疼痛**，立即停止。
- 3 逐漸增加佩戴時間，讓身體適應。
- 4 保持裝置清潔，並按指示適時休息。

實用資訊

- 呢個療法私密，可以喺家中進行；好多人會配合其他佩羅尼氏症治療一齊使用。
- 需要耐心—以數個月嚟評估效果，唔係幾日。
- 請問你嘅醫療團隊推薦邊款裝置同使用時間表。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 陰莖**麻木**或冰冷、蒼白、發藍，並且唔能迅速恢復
- 持續疼痛、皮膚破損或潰瘍
- 彎曲加劇或出現新嘅硬塊

常見副作用

- 裝置接觸位置出現暫時性泛紅或印痕
- 輕微不適，適應後會改善

要記住嘅三件事

1. 陰莖牽引治療透過輕柔拉伸陰莖，減少佩羅尼氏症彎曲並幫助保持長度—非手術，安全。
2. 必須**每日持續使用數個月**先有效；效果係漸進而溫和嘅，通常配合其他治療使用。
3. 唔好過度收緊。出現麻木、顏色改變或持續疼痛時，立即停止並聯絡醫療團隊。