

經皮脛神經刺激術 (PTNS)

病人須知 · 透過踝部輕柔神經刺激治療膀胱過度活躍症

WARWIKI

PTNS 係一種唔需要藥物、喺診所進行嘅療程，用嚟治療膀胱過度活躍症 (OAB) — 包括尿急、頻繁去廁所同急迫性尿失禁。醫生會喺你踝部附近插入一支極幼嘅針，向脛神經輸送溫和電脈衝。脛神經同控制膀胱嘅神經共用同一條脊椎神經路徑，經過一系列療程後，可以令膀胱訊號平靜落嚟。

點樣運作

脛神經喺內踝附近，同控制膀胱嘅脊椎神經相連。輕柔刺激佢會發出訊號，**重新訓練並平靜**膀胱嘅過度活躍 — 減少尿急同尿頻。呢個療程唔用藥，亦唔會有全身性副作用。

呢個療程啱唔啱我？

- 如果改變生活習慣唔夠有效，而你又想**避免用藥**（或者藥物令你冇副作用），呢個係個好選擇
- 唔用藥 — 適合唔能夠服用膀胱藥物嘅人
- 需要**持續回診**先至有效並維持療效

詞彙解釋

膀胱過度活躍症

膀胱太早收縮，引起尿急同尿頻。

脛神經

踝部附近嘅神經，連接膀胱嘅神經供應。

神經調節

利用溫和電訊號令過度活躍嘅神經平靜。

經皮

透過皮膚 — 即係用幼針電極插入。

維持療程

定期跟進療程以維持療效。

會唔會痛？ 大多數人只係感覺到輕微麻刺感、脈衝感或腳趾輕輕捲起 — 唔係痛。每次療程約 **30 分鐘**，你坐住就可以，之後可以自己駕車回家，即時恢復正常活動。

會發生咩事

- 1 你坐低並承托腳部；醫生會喺內踝附近插入一支**極幼嘅針電極**。
- 2 一部小裝置會輸送**溫和電脈衝**，歷時約 30 分鐘。
- 3 針會被移除 — 兩次療程之間唔會有任何東西留喺體內。

療程安排

- 通常先**每週一次，共 12 週**。
- 有效果嘅人之後需要繼續進行**定期維持療程**以保持療效。
- 部分診所亦提供**可植入式**脛神經裝置，方便長期居家使用。

注意事項

- 要完成**完整 12 週**療程 — 療效係逐步積累嘅。
- 唔需要藥物、唔需要手術，亦唔需要復原時間。
- 需要持續療程；停止後療效可能減退。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 踝部注射位置出現紅腫或滲液
- 發燒，或療程後踝部明顯疼痛
- 膀胱症狀突然惡化

要記住嘅三件事

1. PTNS 透過踝部溫和神經刺激令膀胱過度活躍症平靜 — 唔用藥，無全身性副作用。
2. 療程通常每週一次共 12 週，之後繼續維持療程；每次約 30 分鐘，唔痛。
3. 要完成整個療程，並計劃持續維持療程以保持療效。