

三度及四度會陰裂傷

病人須知 · 嚴重分娩裂傷 — 修復與康復

WARWIKI

陰道分娩時，陰道與肛門之間嘅部位（會陰）可能會撕裂。三度裂傷係撕裂至肛門括約肌；四度裂傷係穿過括約肌入直腸內壁。呢兩種合稱 OASIS（產科肛門括約肌損傷）。分娩後會即刻仔細修復，只要做好術後護理，大多數女性都可以好好康復。

發生咗咩事

肛門括約肌係控制放氣同大便嘅環形肌肉。嚴重裂傷影響到呢塊肌肉，所以仔細修復同跟進好重要 — 係為咗保護你長遠嘅大便控制能力。呢類裂傷唔係你嘅錯，同你做咗咩係冇關係嘅。

修復手術

修復係喺分娩後盡快進行，通常喺手術室或分娩室，配合良好麻醉（多數係脊椎或硬膜外麻醉）。外科醫生會**逐層**重建組織 — 接合括約肌，四度裂傷仲要修復直腸內壁 — 用可吸收縫線。你會獲處方抗生素，以及止痛同腸道護理計劃。

詞彙解釋

會陰

陰道與肛門之間嘅部位。

OASIS

產科肛門括約肌損傷 — 即三度或四度裂傷。

肛門括約肌

控制放氣同大便嘅環形肌肉。

三度裂傷

撕裂至肛門括約肌。

四度裂傷

穿過括約肌入直腸內壁。

大便軟化劑

令大便變軟嘅藥，令你喺康復期間唔使用力。

盆底物理治療

康復後重建盆底肌力與協調性嘅治療。

會唔會有長期問題？ 大多數女性都能康復良好，恢復正常控制能力。少數人會感到難以控制放氣或大便，所以跟進檢查同盆底治療好重要 — 如果症狀持續，係有有效治療嘅。有任何漏氣或漏便，請即刻話畀醫療團隊知，唔好等。

康復與自我護理

- 1 保持大便柔軟** — 服用處方大便軟化劑，多飲水，多食纖維，唔好用力排便。
- 2 止痛與衛生** — 按指示服用止痛藥，如廁後用溫水沖洗，保持傷口清潔乾爽。
- 3 休息，慢慢恢復** — 避免搬重物（除咗抱BB），預計需要數個星期逐步改善。
- 4 盆底物理治療** — 初步愈合後有助重建肌力。

跟進與日後分娩

- 醫生會檢查傷口愈合情況同大便控制能力。
- 討論**日後分娩**方式 — 醫療團隊會建議下次最安全嘅生產方式。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒、傷口愈來愈痛或有異味分泌物（可能係感染）
- 傷口似乎裂開
- 漏氣或漏便，或新出現難以控制嘅情況
- 嚴重便秘或完全唔能夠大便

溫馨提示

- 坐時可用坐墊，早期可用冰敷減輕腫脹。
- 除非醫療團隊指示，否則唔好將任何東西放入直腸（包括栓劑或灌腸）。

要記住嘅三件事

1. 三度或四度裂傷（OASIS）涉及肛門括約肌，分娩後會即刻逐層修復。
2. 保持大便柔軟、護理傷口、做盆底物理治療 — 大多數女性都可以康復良好。
3. 如有漏氣或漏便、發燒、或傷口裂開，請盡快求助 — 及早處理效果更好。