

佩羅尼氏病係指陰莖壁內形成一塊疤痕組織（稱為硬塊），令陰莖彎曲、收窄、凹陷或縮短，有時勃起時會痛，可能令性行為困難。呢個病常見，唔係癌症，亦有有效治療方法 — 最合適嘅方案取決於病情所處嘅階段。

關於呢個病

佩羅尼氏病通常分兩個階段：

- **活躍（急性）期** — 彎曲仍在變化，可能有痛楚，通常持續 6–18 個月。
- **穩定期** — 彎曲同硬塊已穩定，痛楚通常減退。

治療方案取決於你處於哪個階段，醫療團隊會問你情況點樣隨時間變化。

成因

一般認為係性行為期間陰莖輕微彎折受傷，傷口以異常疤痕代替正常組織癒合。年紀越大、有糖尿病、曾接受前列腺手術、或有**杜普伊特倫攣縮症**（手部類似嘅繩索狀病變）嘅人士較常見。

詞彙解釋

佩羅尼氏病

陰莖內疤痕組織引致彎曲或變形。

硬塊

造成彎曲嘅疤痕組織塊。

活躍期 vs. 穩定期

彎曲仍在變化，定係已經穩定。

牽引治療

利用裝置輕柔拉伸陰莖以改善彎曲及長度。

膠原蛋白酶（Xiaflex）

注射入硬塊以分解疤痕組織嘅藥物。

折疊術 / 移植術

矯直陰莖嘅外科手術方法。

係咪要急於做手術？ 通常唔需要。**活躍期**間彎曲仍在變化，重點係舒緩不適及非手術方案。矯直手術係等情況**穩定**後先考慮（通常係彎曲維持不變、痛楚消退之後）。唔少人唔做手術都有所改善。

點樣診斷

- 了解彎曲、痛楚及變化歷程
- 觸診硬塊；有時需要勃起時嘅照片或診所內評估
- 偶爾以超聲波描繪硬塊及血流

點樣治療（按階段）

- 1 **活躍期** — 安撫、止痛，以及**牽引治療**；目標係減少惡化。
- 2 **硬塊注射** — 將**膠原蛋白酶（Xiaflex）**等藥物注射入硬塊以減少彎曲。
- 3 **手術（穩定期）** — **折疊術**（縫合較長一側；最簡單，可能略縮短）或**硬塊切除/移植術**（保留長度，適合嚴重彎曲）。
- 4 **陰莖假體** — 如同時有勃起功能障礙 (ED)。各方案有獨立說明。

注意事項

- 唔好強行「矯直」陰莖 — 會加重損傷。
- 如彎曲唔影響性行為，可以只觀察。
- 呢個病可影響情緒同關係 — 尋求支援有幫助。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 彎曲**妨礙性行為**，或彎曲加劇
- 勃起時有明顯**痛楚**
- 彎曲同時出現新嘅**勃起功能障礙**

要記住嘅三件事

1. 佩羅尼氏病係陰莖內嘅疤痕組織 — 常見、唔係癌症、可以治療。
2. 治療取決於階段：活躍期著重舒緩；穩定後才考慮矯直手術。
3. 唔少人唔做手術都有改善。如彎曲妨礙性行為、持續痛楚或新發 ED，請睇醫生。