

恥骨聯合瘻管（尿液侵蝕恥骨瘻管）

病人須知 · 尿液侵蝕恥骨，引起痛楚同感染

WARWIKI

恥骨聯合瘻管（又叫尿道恥骨瘻管）係泌尿道（膀胱頸或尿道）同骨盆前方恥骨聯合關節之間出現嘅異常通道——通常伴有骨骼感染。症狀包括嚴重恥骨或腹股溝痛、以及行路困難。呢個情況唔常見但係嚴重，不過係有明確嘅治療方案。

關於呢個病

尿液滲漏侵蝕恥骨，引致骨骼感染（**骨髓炎**）同關節受損。典型症狀：

- **嚴重恥骨、腹股溝或盆腔痛**，行路時往往更痛
- 行路困難或無法負重
- 反覆尿道感染；有時漏尿

痛楚初期容易被誤當係關節炎或骨科問題，令診斷延誤。

成因

幾乎全部係**前列腺癌治療**嘅晚期併發症——尤其係**放射治療**後，加上之前曾做過膀胱頸或尿道手術。受輻射影響嘅組織癒合能力差，令尿液得以侵蝕入骨。

詞彙解釋

恥骨聯合

骨盆前方兩塊恥骨相接嘅關節。

恥骨聯合瘻管

泌尿道同呢個關節／骨骼之間嘅異常通道。

骨髓炎

骨骼感染。

MRI

最佳影像檢查，可清楚顯示骨骼同瘻管位置。

清創術

手術切除受感染嘅骨骼同組織。

尿流改道

將尿液繞過受損部位引流，通常係持久嘅解決方法。

點解要咁積極治療？ 因為問題在於**受感染、癒合能力差（通常受過放射治療）嘅組織同骨骼**，單純修補通常無效。要持久緩解，通常需要清除受感染嘅骨骼，並**將尿液引離呢個部位**——所以往往建議做尿流改道。好消息係，呢樣可以徹底終結多年嘅痛苦。

點樣診斷

- 骨盆**MRI**（最適合顯示骨骼）以及尿道／膀胱鏡檢查
- 培養化驗以確認感染細菌
- 詳細了解病史——前列腺癌治療、放射治療及手術紀錄

點樣治療

- 1 **抗生素**治療骨骼感染。
- 2 **手術清創**——切除受感染嘅骨骼同組織，清潔患處。
- 3 **尿流改道**——好多男士最終需要做**尿流改道**（有時需要切除受損嘅膀胱／尿道），因為受輻射嘅組織無法正常癒合。
- 4 **組織瓣**——可能需要移入健康嘅肌肉或大網膜，填充並幫助患處癒合。

治療通常需要**多學科團隊**合作（泌尿外科、骨科及／或整形外科）。

重要提示

- 如果你係前列腺放射治療後出現原因不明嘅恥骨痛，記得告知醫生呢個情況——呢個病容易被忽略。
- 尿流改道聽落嚇人，但往往正係可以**徹底止痛**並消除感染嘅方法。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒、畏寒或感覺非常不適（可能係感染擴散）
- 恥骨／腹股溝痛加劇或**無法行路**
- 無法小便，或大量出血

要記住嘅三件事

1. 恥骨聯合瘻管令尿液侵蝕恥骨，引致劇痛同骨骼感染——通常係前列腺放射治療多年後出現。
2. 呢個病容易被誤當係關節炎；MRI 可作確診。記得告知醫療團隊你曾接受放射治療。
3. 治療需切除受感染嘅骨骼，通常要做尿流改道——雖然積極，但可以徹底終結痛苦。