

直腸尿道瘻管（男性）

病人須知 · 直腸同尿道之間嘅異常通道

WARWIKI

直腸尿道瘻管（rectourethral fistula）係直腸（肛門通道）同尿道（排尿管道）之間嘅一條異常小通道。尿可以流入直腸，氣體或大便可以進入尿道，引起反覆感染。呢個情況令人困擾，但係可以修復嘅 — 通常需要分階段進行手術。

關於呢個病

症狀通常包括**尿入面有氣或大便**（小便時有氣泡、尿液混濁或有異味）、**尿液從直腸滲出**、反覆尿道感染，以及盆腔不適。呢個係結構問題，可以透過手術解決 — 唔係你做錯咩嘢引起嘅。

成因

大多數直腸尿道瘻管係**前列腺癌治療嘅併發症** — 包括手術（前列腺切除術）、**放射治療**、或消融術（如冷凍治療或 HIFU） — 亦可能係直腸手術後引起。少數情況由創傷、感染或炎性腸病引致。****放射治療****後嘅瘻管較難癒合。

詞彙解釋

瘻管

連接兩個器官嘅異常通道。

直腸尿道

直腸同尿道之間。

氣尿症

尿液中出現氣泡。

糞尿症

尿液中含有大便成分。

分流

暫時改變尿液或大便嘅排出路徑，讓傷口癒合。

結腸造口術

暫時開設大便出口，之後可以還原。

股薄肌皮瓣

常用於加固修復嘅大腿肌肉組織瓣。

點解可能需要先做臨時造口或放尿管？ 分流尿液（放尿管）、有時分流大便（臨時結腸造口），可以減少該區域嘅壓力、控制感染、讓發炎組織平靜下來 — 令之後嘅修復手術有最大機會成功癒合。分流通常係**臨時**嘅，癒合後會還原。

點樣診斷

- 用內視鏡檢查膀胱／尿道（**膀胱鏡檢查**）同直腸
- **染料測試**及影像學檢查，確定瘻管位置同大小
- 了解你嘅病史（前列腺治療、放射治療）及組織狀況

點樣治療

- 1 **穩定及分流** — 放置尿管（有時加臨時結腸造口），控制症狀、讓組織恢復。
- 2 **手術修復** — 通常經陰囊同肛門之間嘅會陰入路，分層縫合關閉通道。
- 3 **組織瓣加固** — 用健康肌肉（通常係**股薄肌**大腿組織瓣）填充修復位置，尤其係放射治療後。
- 4 **還原** — 確認癒合後，臨時造口會還原。

注意事項

- 時機很重要 — 外科醫生通常等待炎症消退後先進行修復。
- 細小、未經放射治療嘅瘻管偶爾只靠尿管就可以自行閉合。
- 均衡飲食同戒煙有助癒合。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- **發燒、寒顫或感覺非常不適**（可能係嚴重感染）
- **嚴重盆腔或直腸痛**
- **唔能夠小便**，或大量出血

要記住嘅三件事

1. 直腸尿道瘻管係直腸同尿道之間嘅異常通道 — 引起尿中有氣／大便及感染 — 通常係前列腺癌治療後出現。
2. 治療通常分階段進行：先分流穩定，再手術修復（放射治療後常需組織瓣），然後還原臨時造口。
3. 呢個病係可以修復嘅。如有發燒、劇痛或唔能夠小便，請立即求醫。