

骶骨陰道固定術

WARWIKI

病人須知 · 用網片將陰道頂部提升並固定嘅耐久性修復手術

骶骨陰道固定術係修復陰道頂部或子宮脫垂（頂端脫垂）最耐久嘅手術之一。醫生會用一塊軟網片將陰道頂部提起，並固定喺尾骨上方嘅強韌韌帶（骶骨），令陰道回復正常位置同深度。手術通常以微創（機械臂或腹腔鏡）方式進行，術後仍可保留性生活能力。

關於呢個手術

醫生會將一塊網片縫合喺陰道頂部嘅前後壁，然後固定喺骶骨上方嘅堅韌韌帶。呢樣嘢將陰道維持喺正常位置。由於效果持久，呢個手術被視為頂端脫垂修復嘅金標準。

關於網片

手術所用嘅網片係經腹部放入，有充分嘅安全研究記錄。佢同曾被美國食品藥品監督管理局（FDA）警告並下架嘅經陰道脫垂網片係不同嘅產品。你嘅外科醫生會講解小概率嘅風險，包括罕見嘅網片外露情況。

詞彙解釋

頂端／穹隆

陰道頂部，生育後或切除子宮後有可能向下脫垂。

骶骨

脊椎底部嘅骨頭；其韌帶係手術固定點。

網片

用嚟支撐陰道頂部嘅柔軟永久性材料。

機械臂／腹腔鏡

透過幾個小切口進行嘅微創手術。

網片外露

少見情況，一小部分網片外露，可以治療。

子宮切除術

切除子宮，有時會同步進行。

會唔會痛？ 手術係全身麻醉下進行，過程中你唔會有感覺。微創手術後大多數人只係感覺小切口附近輕微痠痛，加上少少脹氣不適，通常當天或住院一晚後就可以回家。如果係較大型嘅開腹手術，復原期會長啲。

點樣準備

- 手術需要**全身麻醉** — 請跟從禁食同用藥指示（如被告知需停服薄血藥，請照做）。
- 術前評估；有時會同步進行**子宮切除術**或尿失禁手術。
- 戒煙；安排人接送同術後在家協助你。

會發生咩事

- 1 你會入睡；醫生會為你注射抗生素。
- 2 透過微創小切口（或一個開腹切口），將網片縫合喺陰道頂部。
- 3 網片固定喺骶骨韌帶，將陰道提升至正常位置。
- 4 短期放置尿管。

之後

- 當天或住院一晚後回家；初期進行輕量活動。
- **約 6 週內避免搬重物、用力及性行為。**
- 少量出血同輕微不適屬正常；注意預防便秘。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或畏寒
- 大量出血，或腹部／盆腔痛持續加劇
- **完全無法小便**，或持續噁心／嘔吐
- 陰道分泌物有異味，或日後性交時出現痛楚（可能係網片問題）

要記住嘅三件事

1. 骶骨陰道固定術用網片將陰道頂部固定喺骶骨上 — 係頂端脫垂最耐久嘅修復方法，通常以微創進行。
2. 手術所用嘅腹部網片有充分研究支持，與已下架嘅經陰道脫垂網片不同。
3. 約 6 週內避免搬重物同性行為。如出現發燒、大量出血、無法小便或日後有異味／痛楚，請即刻聯絡醫療團隊。