

前列腺切除術（簡單）

WARWIKI

病人須知 · 針對非常大嘅良性前列腺增生 (BPH) 嘅手術

簡單前列腺切除術係針對非常大嘅良性前列腺增生 (BPH) 阻塞尿流嘅手術。外科醫生會經腹部切除前列腺內層嘅增生組織——就係造成阻塞嗰部分——可以係開腹或者微創/機械人手術。對於大型前列腺特別有效。

重要區別

“簡單”前列腺切除術唔等於針對前列腺癌嘅“根治性”前列腺切除術。根治性手術係切除整個前列腺嚟治療癌症。簡單前列腺切除術只係切除內層增生（良性）組織，保留外層外殼——係治療非癌性增大引起嘅阻塞。

適用情況

- 適合**前列腺非常大**、唔適合標準內窺鏡手術（TURP）嘅患者
- 尤其係同時有**膀胱結石**或大型膀胱憩室需要處理嘅情況
- 針對大型前列腺嘅內窺鏡選項（**HoLEP**、**Aquablation**）係替代方案——你嘅醫生會建議最適合你嘅方法

詞彙解釋

簡單前列腺切除術

切除內層增生前列腺治療 BPH（非癌症手術）。

腺瘤

被切除嘅良性前列腺內層組織。

根治性前列腺切除術

係另一種手術，切除整個前列腺治療癌症。

開腹 vs. 機械人

一個大切口，或者幾個小孔微創手術。

逆行射精

乾性高潮——常見嘅術後反應。

尿管

術後幾日用嚟引流膀胱嘅管。

會唔會痛？ 手術係全身麻醉下進行，過程中你唔會有任何感覺。因為係腹部手術，康復時間**比內窺鏡手術長**——預計住院幾日（機械人手術較短），留尿管幾日，活動限制幾個星期。

點樣準備

- 需要**全身麻醉**——按照指示禁食同停藥（按指示暫停薄血藥）。
- 先做**尿液測試**排除感染。
- 唔好吸煙；安排人接送同照顧你返家。

會發生咩事 & 之後

- 1 你會睡著；同時注射抗生素。
- 2 經腹部（開腹）或機械人/微創方式，切除前列腺內層增生組織，保留外層外殼。
- 3 放置尿管（有時加引流管）；住院幾日（機械人手術較短）。
- 4 尿管通常留幾日至約一個星期。

初期小便可能有血；**避免重物勞動同用力**數個星期。

術後會點樣

- 尿流強度會有顯著而持久嘅改善。
- **逆行射精**（乾性高潮）好常見；對勃起或尿控嘅嚴重影響唔常見。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 拔除尿管後**唔能夠排尿**
- **大量出血或血塊**，或者發燒/發冷
- 腹痛加劇，或傷口紅腫/有分泌物
- 胸痛、呼吸困難，或腳部腫脹疼痛（緊急情況）

要記住嘅三件事

1. 簡單前列腺切除術係切除非常大嘅 BPH 內層增生組織——**唔係癌症手術**（癌症手術係切除整個前列腺）。
2. 對大型前列腺非常有效；康復時間比內窺鏡手術長（HoLEP/Aquablation 係內窺鏡替代方案）。
3. 預期會有乾性射精，同埋留尿管幾日。如唔能排尿、大量出血或發燒請即刻求醫。