

Увеличенная простата (BPH)

WARWIKI

Информация для пациента · Почему возникают симптомы и как их лечат

Увеличенная простата — доброкачественная гиперплазия простаты (BPH) — это распространённое, незлокачественное увеличение простаты с возрастом. Железа давит на мочеиспускательный канал и вызывает нарушения мочеиспускания. BPH — это **не** рак и не приводит к раку; существует множество эффективных методов лечения: от изменения образа жизни до хирургии.

Об этом состоянии

Простата охватывает верхнюю часть уретры. При увеличении она сдавливает канал, вызывая **симптомы нижних мочевыводящих путей (LUTS)**:

- Слабая или замедленная струя, затруднённое начало, прерывистое мочеиспускание
- Ощущение **неполного опорожнения** и подтекания в конце
- **Учащённые** и неотложные позывы, ночные пробуждения (ноктурия)

Чем это опасно

BPH влияет прежде всего на **качество жизни**, но при тяжёлом течении может приводить к инфекциям, камням в мочевом пузыре, задержке мочи или, редко, нагрузке на мочевой пузырь и почки. Выраженность симптомов определяет интенсивность лечения.

ТЕРМИНЫ

BPH

Доброкачественная гиперплазия простаты — незлокачественное увеличение простаты.

LUTS

Симптомы нижних мочевыводящих путей, которые вызывает BPH.

IPSS

Шкала симптомов для оценки их выраженности.

Задержка мочи

Невозможность помочиться — требует срочной помощи.

Альфа-блокатор / 5-ARI

Два основных класса препаратов при BPH.

PSA

Анализ крови на простату, обычно выполняется при обследовании.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ЛЕЧИТЬСЯ? Только если симптомы вас беспокоят — лёгкие проявления можно просто наблюдать. При ухудшении лечение переходит от изменения образа жизни к препаратам, а затем к процедурам — на каждом уровне есть эффективный вариант. Выбор также зависит от размера простаты, который определит врач.

Как это обследуют

- **Шкала симптомов (IPSS)** и анализ приёма жидкости и лекарств
- Осмотр простаты, **анализ мочи** и, как правило, **PSA**
- Тест скорости мочеиспускания и оценка остаточной мочи

Как это лечат (поэтапно)

- 1 **Наблюдение и образ жизни** — ограничение жидкости вечером, кофеина и алкоголя, тренировка мочевого пузыря.
- 2 **Препараты — альфа-блокатор** (быстрый эффект), **5-альфа-редуктазный ингибитор** (уменьшает простату при значительном увеличении) или оба; иногда другие группы.
- 3 **Малоинвазивные методы** — например, лифт уретры простаты или паровая терапия.
- 4 **Хирургия** — TURP, HoLEP, Aquablation или простатэктомия при крупной простате или неэффективности других методов. На каждую процедуру есть отдельный информационный лист.

Полезно знать

- Лечение ВРН определяется **степенью беспокойства** — спешить не нужно, если осложнений нет.
- Некоторые препараты от простуды и заложенности носа (деконгестанты) могут усиливать симптомы.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Внезапная невозможность помочиться** (болезненный, переполненный мочевой пузырь) — срочно
- **Кровь в моче**, повышение температуры или повторяющиеся инфекции
- Нарастание симптомов несмотря на лечение

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. ВРН — распространённое незлокачественное увеличение простаты, вызывающее нарушения мочеиспускания.
2. Лечение выбирается по степени беспокойства: сначала образ жизни, затем препараты, затем малоинвазивные или хирургические методы.
3. Срочно обратитесь за помощью при внезапной задержке мочи, крови в моче, повышении температуры или повторяющихся инфекциях.