

Бета-3-агонисты (при гиперактивном мочевом пузыре)

Информация для пациента · Современные таблетки для мочевого пузыря с меньшим числом побочных эффектов

WARWIKI

Бета-3-агонисты — современный класс препаратов при **гиперактивном мочевом пузыре (ОАВ)**: ургентных позывах, учащённом мочеиспускании и ургентном недержании. Они расслабляют мочевой пузырь, увеличивая его ёмкость, и вызывают **значительно меньше сухости во рту, запоров и нарушений памяти**, чем старые антихолинергические препараты. К этому классу относятся **mirabegron (Myrbetriq)** и **vibegron (Gemtesa)**.

Как это действует

Препараты активируют **бета-3-рецепторы** в стенке мочевого пузыря, **расслабляя мышцу** во время наполнения. Более спокойный пузырь реже посылает ургентные сигналы — механизм отличается от антихолинергиков.

Чего ожидать

- Эффект нарастает **в течение нескольких недель**; принимается **один раз в день**.
- Хорошо переносится — практически без сухости во рту.
- Подходит **пожилым пациентам** и тем, у кого были побочные эффекты от антихолинергиков.
- При упорных симптомах иногда сочетают с антихолинергическим препаратом.

ТЕРМИНЫ

Гиперактивный мочевой пузырь (ОАВ)

Ургентные позывы и учащённое мочеиспускание из-за преждевременных сокращений пузыря.

Бета-3-агонист

Препарат, расслабляющий пузырь через бета-3-рецепторы.

Mirabegron / vibegron

Два препарата этого класса.

Антихолинергик

Старый класс препаратов при ОАВ; бета-3-агонисты лишены многих его побочных эффектов.

Артериальное давление

Mirabegron может незначительно повышать его — за этим следят.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЭТИ ТАБЛЕТКИ, А НЕ СТАРЫЕ? Бета-3-агонисты действуют примерно так же, как антихолинергики, но вызывают **значительно меньше сухости во рту и запоров** и не влияют на память — поэтому их нередко предпочитают, особенно пожилым пациентам. Главный момент контроля — артериальное давление.

Как принимать

- Принимайте **один раз в день** по назначению врача; дайте несколько недель на развитие эффекта.
- Сочетайте с тренировкой мочевого пузыря и упражнениями Кегеля для лучшего результата.
- Регулярно посещайте врача: он оценит эффект и проверит давление.

Важная безопасность

- **Mirabegron может повышать артериальное давление** — за этим наблюдают; препарат не назначают при высоком или неконтролируемом давлении. (Vibegron практически не влияет на давление.)
- Сообщите врачу обо всех принимаемых лекарствах — mirabegron может менять их уровень в крови.
- Как и при любом лечении ОАВ, сообщайте, если возникнут затруднения при мочеиспускании.

Частые побочные эффекты

- Как правило, незначительные — головная боль, заложенность носа
- Повышение артериального давления (преимущественно mirabegron)
- Инфекция мочевыводящих путей, возможен запор

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Резкое повышение давления** или сильная головная боль
- Вы **не можете помочиться** или ощущаете неполное опорожнение
- Отёк лица, губ или языка, затруднённое дыхание (редкая аллергия) — вызовите скорую помощь

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Бета-3-агонисты расслабляют мочевой пузырь и уменьшают симптомы ОАВ при **значительно меньшей сухости во рту**, чем у старых препаратов.
2. Часто подходят пожилым пациентам или тем, у кого были побочные эффекты антихолинергиков; дайте несколько недель на эффект.
3. Mirabegron может повышать давление — не пропускайте визиты. Обратитесь к врачу, если не можете помочиться или давление резко повысилось.