

Botox для мочевого пузыря (при нарушении контроля мочеиспускания)

WARWIKI

Информация для пациента · Инъекции для успокоения гиперактивного мочевого пузыря

Botox в мочевой пузырь применяют при **гиперактивном мочевом пузыре (OAB)** — сильных позывах, учащённом мочеиспускании и ургентном недержании — когда изменение образа жизни и медикаменты не дали достаточного результата. Через небольшой эндоскоп в мышцу мочевого пузыря вводят микродозы ботулинического токсина, чтобы расслабить её. Эффект нарастает в течение 1–2 недель и сохраняется около 6 месяцев.

Как это действует

Гиперактивная мышца мочевого пузыря сокращается тогда, когда не должна. Botox **расслабляет эту мышцу**, прекращая неконтролируемые сокращения — и уменьшает позывы, частоту мочеиспускания и ургентное недержание. Улучшение наступает не сразу; вы заметите его через **1–2 недели**.

Это безопасно?

Да, метод хорошо изучен. Важно знать: расслабляя мочевой пузырь, Botox иногда затрудняет его **полное опорожнение** — небольшому числу пациентов временно требуется **самокатетеризация** до окончания действия препарата. Поэтому вы должны быть готовы при необходимости освоить этот навык. Среди других возможных последствий — инфекция мочевыводящих путей (UTI) и кратковременная кровь в моче.

ТЕРМИНЫ

Гиперактивный мочевой пузырь

Сильные позывы и учащённое мочеиспускание из-за преждевременного сокращения пузыря.

Ботулинический токсин (Botox)

Препарат, расслабляющий мышцы при введении в них.

Детрузор

Мышца мочевого пузыря, в которую производят инъекцию.

Цистоскоп

Тонкая камера для доставки инъекций.

Самокатетеризация

Введение тонкой трубки для опорожнения пузыря — иногда требуется временно.

Остаточная моча

Моча, оставшаяся после мочеиспускания — проверяется после процедуры.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Сначала в пузырь вводят обезболивающий раствор, поэтому большинство пациентов ощущают лишь лёгкое давление во время кратких инъекций. Как правило, это **амбулаторная процедура под местной анестезией**, занимающая около 10–15 минут; после неё вы сразу идёте домой.

Как подготовиться

- **Анализ мочи** перед процедурой для исключения инфекции.
- Возможно назначение **антибиотика** в день процедуры.
- Сообщите врачу о приёме **разжижающих кровь препаратов** и будьте готовы при необходимости освоить самокатетеризацию.

Как это проводят

- 1 В мочевой пузырь вводят обезболивающий раствор.
- 2 Через уретру проводят тонкий **цистоскоп**.
- 3 Боток вводят в стенку пузыря в нескольких точках.
- 4 Эндоскоп извлекают — вся процедура занимает около 10–15 минут.

После

- Лёгкое жжение или небольшая примесь крови в моче на день-два — это нормально.
- Улучшение нарастает в течение 1–2 недель; эффект длится около 6 месяцев, процедуру можно **повторять**.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Нет мочеиспускания** или вы чувствуете, что пузырь не опорожняется
- Повышение температуры или озноб (возможная инфекция)
- Обильное кровотечение или сгустки крови в моче
- Жжение, усиливающееся через несколько дней

Полезно знать

- После процедуры обычно **проверяют** степень опорожнения пузыря.
- При повторных курсах между ними выдерживают интервал в несколько месяцев.

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Боток расслабляет гиперактивную мышцу мочевого пузыря, уменьшая позывы, учащённое мочеиспускание и ургентное недержание; эффект нарастает за 1–2 недели и длится ~6 месяцев.
2. Процедура быстрая, амбулаторная, с обезболиванием; основной компромисс — возможная временная потребность в самокатетеризации.
3. Немедленно позвоните врачу, если после процедуры вы не можете помочиться или появилась температура.