

Трансплантат слизистой щеки

Информация для пациента · Графт из щеки для восстановления уретры или мочеочника

WARWIKI

В ходе реконструктивной операции хирург берёт небольшой лоскут влажной слизистой с внутренней стороны щеки — трансплантат слизистой щеки (buccal mucosa graft) — для восстановления уретры (или, реже, мочеочника). В этом листке объясняется, почему используется щека, что происходит и как будет заживать ваш рот.

Об этой процедуре

Внутренняя поверхность щеки покрыта прочной влажной тканью, хорошо подходящей для мочевых путей. Тонкий овальный лоскут берут с одной щеки (иногда с обеих — при необходимости длинного восстановления) и используют для расширения или реконструкции суженного участка. Графт забирают **под общей анестезией, в рамках той же операции**, что и основная реконструкция.

Почему именно щека?

- Ткань безволосая и привычна к влажной среде — как мочевые пути
- Прочная, быстро заживает с минимальным рубцеванием, устойчива к инфекции
- Берётся в ходе той же операции — нет дополнительного разреза, видимых рубцов не остаётся

Это безопасно?

Да. Забор щёчного графта — хорошо изученная, хорошо переносимая часть урологической хирургии с высокой удовлетворённостью пациентов. Хирург обходит слюнной проток и угол рта. Основные ощущения связаны с ротовой полостью: болезненность, скованность или онемение — и проходят в первые 1–2 недели. Забор с обеих щёк даёт больше дискомфорта, поэтому применяется только при необходимости длинного восстановления.

ТЕРМИНЫ

Слизистая щеки (buccal mucosa)

Влажная оболочка с внутренней стороны щеки.

Трансплантат (графт)

Лоскут собственной ткани, перемещённый для восстановления другого участка.

Уретра

Трубка, по которой моча выходит из тела.

Уретропластика

Операция по восстановлению уретры; щёчный графт — её часть.

Донорский участок

Место, откуда берут графт — здесь это внутренняя поверхность щеки.

Общая анестезия

Препараты, поддерживающие сон и отсутствие боли во время операции.

Проток слюнной железы

Небольшое отверстие внутри щеки; хирург его не затрагивает.

Тризм

Временное ограничение открывания рта; проходит при регулярной растяжке.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Графт берут под общей анестезией — во время операции вы ничего не чувствуете. После — щека болит, как при прикусе или язве, может ощущаться скованность или онемение. Болезненность проходит за 1–2 недели, затем щека заживает ещё около месяца.

Как подготовиться (до операции)

- Графт берут в ходе реконструктивной операции **под общей анестезией** — соблюдайте все стандартные предписания (голод, отмена препаратов).
- **Заботьтесь о ротовой полости** заранее: чистите зубы и полощите рот; врач может направить вас к стоматологу.
- **Не курите и не употребляйте табак** — это замедляет заживление рта и графта. Отказ до операции существенно помогает.

Сообщите врачу заранее, если у вас:

- Были операции на рту, щеке, челюсти или облучение головы и шеи
- Есть заболевания ротовой полости или ограничение открывания рта
- Привычка жевать табак или бетель, либо нелеченные стоматологические проблемы

Что происходит во время операции

- 1 Вы спите под общей анестезией на протяжении всей операции; рот мягко фиксируют в открытом положении.
- 2 Хирург иссекает тонкий овальный лоскут слизистой с одной щеки (с обеих — при длинном восстановлении), не затрагивая слюнной проток и угол рта.
- 3 Графт формируют и используют для расширения или реконструкции суженного участка мочевого пути.
- 4 Щеку, как правило, оставляют заживать самостоятельно или ушивают рассасывающимися швами.

После операции (рот)

- **Заживление двухэтапное:** болезненность и скованность **проходят за 1–2 недели**, но щека продолжает заживать около месяца; **онемение может сохраняться месяц и дольше.**
- Питайтесь **мягкой, нераздражающей пищей**; избегайте острого, кислого, горячего, хрустящего и алкоголя. После еды осторожно полощите рот.
- Ежедневно **осторожно растягивайте рот**, чтобы уменьшить скованность. **Видимых рубцов нет** — графт взят изнутри.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Температура или озноб
- Обильное или не прекращающееся кровотечение изо рта
- Нарастающая боль, отёк или гной в рту (признаки инфекции)
- Невозможность пить или открыть рот

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Небольшой лоскут влажной слизистой с внутренней стороны щеки используется для восстановления уретры — он безволосый, хорошо приживается и не оставляет видимых рубцов.
2. Графт берут под общей анестезией в ходе той же операции. Для подготовки: соблюдайте предписания по голоданию и препаратам, следите за ротовой полостью и не курите.
3. Щека будет болеть, ощущаться скованность или онемение — **улучшение за 1–2 недели, полное заживление — за месяц и дольше.** Ешьте мягкую пищу, полощите рот и делайте растяжку.