

Thuốc ức chế PDE5 (Thuốc trị ED & Tuyến tiền liệt)

Thông tin cho bệnh nhân · Thuốc viên trị rối loạn cương dương — và triệu chứng tiểu tiện do tuyến tiền liệt to

WARWIKI

Thuốc ức chế PDE5 là thuốc viên dùng để điều trị **rối loạn cương dương (ED)**, và một loại trong nhóm này (tadalafil) cũng giúp giảm triệu chứng tiểu tiện do **tuyến tiền liệt to**. Các thuốc phổ biến gồm **sildenafil (Viagra)**, **tadalafil (Cialis)**, **vardenafil** và **avanafil**. Chúng giúp cơ thể tạo ra sự cương dương khi có kích thích — bản thân thuốc không tự gây cương dương.

Cơ chế hoạt động

Các thuốc này **làm giãn mạch máu** ở dương vật để máu có thể dồn vào. Quan trọng là chúng chỉ có tác dụng **khi có kích thích tình dục** — bạn vẫn cần cảm thấy hứng khởi; thuốc không tự tạo ra sự cương dương. Tadalafil còn làm giãn cơ ở tuyến tiền liệt và bàng quang, vì vậy liều thấp dùng hàng ngày có thể cải thiện dòng nước tiểu.

Điều cần biết

- **Sildenafil / vardenafil / avanafil** có tác dụng sau khoảng **30–60 phút** và kéo dài vài giờ.
- **Tadalafil** tác dụng kéo dài hơn (đến ~36 giờ — lựa chọn “cuối tuần”) hoặc có thể dùng **liều thấp hàng ngày**.
- Bữa ăn nhiều chất béo có thể **làm chậm** tác dụng của sildenafil; tadalafil không bị ảnh hưởng bởi thức ăn.
- Có thể cần thử vài lần để tìm đúng liều và thời điểm dùng thuốc.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Thuốc ức chế PDE5

Nhóm thuốc viên (sildenafil, tadalafil, v.v.) dùng để trị ED.

Rối loạn cương dương (ED)

Khó đạt hoặc duy trì sự cương dương đủ cứng để quan hệ tình dục.

Nhóm thuốc nitrate

Thuốc tim/đau ngực **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** được dùng cùng với các thuốc này.

Khi cần vs. hàng ngày

Uống trước khi quan hệ, hoặc liều thấp mỗi ngày.

BPH

Tuyến tiền liệt to; tadalafil cũng điều trị các triệu chứng tiểu tiện do bệnh này.

Cương dương kéo dài (priapism)

Cương dương kéo dài hơn 4 giờ — đây là cấp cứu y tế.

QUY TẮC QUAN TRỌNG NHẤT Không bao giờ dùng các thuốc này cùng với **nhóm thuốc nitrate** (như nitroglycerin hoặc isosorbide để trị đau ngực) hoặc với "poppers" (amyl nitrite). Sự kết hợp này có thể gây **tụt huyết áp nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng**. Hãy thông báo cho tất cả nhân viên y tế rằng bạn đang dùng thuốc ức chế PDE5.

Cách dùng thuốc

- Uống thuốc **theo hướng dẫn** — trước khi quan hệ (khi cần) hoặc hàng ngày, tùy theo đơn thuốc của bạn.
- Đối với sildenafil dùng khi cần, hãy uống lúc **dạ dày tương đối trống** để thuốc có tác dụng nhanh nhất.
- Không uống quá một liều trong 24 giờ trừ khi được chỉ định.

Lưu ý an toàn quan trọng

- **Không dùng cùng nitrate hoặc poppers** — tuyệt đối không (xem phần trên).
- Thận trọng khi dùng cùng **thuốc chẹn alpha** và các thuốc huyết áp khác (có thể gây chóng mặt) — nhóm chăm sóc của bạn sẽ điều chỉnh thời gian và liều lượng.
- Nếu bạn có **bệnh tim nghiêm trọng**, hãy xác nhận với bác sĩ rằng quan hệ tình dục và các thuốc này an toàn cho bạn.
- Hạn chế uống **rượu bia**, vì có thể làm tăng nguy cơ chóng mặt.

Tác dụng phụ thường gặp

- Đau đầu, **đỏ mắt**, nghẹt mũi, khó tiêu
- Đau lưng hoặc đau cơ (thường gặp hơn với tadalafil)
- Thị lực tạm thời bị **ám xanh** (sildenafil/vardenafil)

Đến cấp cứu ngay nếu bạn có:

- Cương dương kéo dài **hơn 4 giờ** (priapism)
- **Mất thị lực hoặc thính lực đột ngột** — ngừng thuốc và đi khám ngay
- **Đau ngực**, ngất xỉu hoặc chóng mặt nặng

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Thuốc ức chế PDE5 giúp bạn cương dương **khi có kích thích** (không tự có tác dụng); tadalafil cũng giúp cải thiện triệu chứng tiểu tiện do tuyến tiền liệt to.
2. **Không bao giờ dùng cùng nitrate hoặc poppers** — tụt huyết áp có thể đe dọa tính mạng.
3. Đến cấp cứu ngay nếu cương dương kéo dài hơn 4 giờ, hoặc mất thị lực/thính lực đột ngột.